

DE RECHTSGESTREEPTHEID VAN ANGULUS FABULA (GMEL.)

Tijdens mijn vakantie op Ameland vond ik op 1 augustus j.l. bij paal 13 ten Noorden van Nes een ongewoon groot aantal schelpjes van Angulus fabula op het strand. Er lagen op dat tijdstip slechts weinig andere soorten bivalvia, nooit zag ik Angulus fabula zo dominerend optreden. De voorgaande nacht had er een matige Zuid-Oostelijke wind gestaan. Dit was natuurlijk een uitgezochte gelegenheid om een vroeger experiment te herhalen. Ik verzamelde in korte tijd zoveel exemplaren als ik maar kon. Het werden er tenslotte 1500, die in plastic zakken werden opgeborgen. De volgende dagen bleek het aantal Angulus fabula op het strand snel af te nemen. De gasten uit het Oosten hadden de meeste verpletterd.

- Thuisgekomen -

Thuisgekomen werd de buit gewassen, gedroogd en op een regenachtige dag uitgezocht. Van de 1500 schelpjes bleken de meeste, zoals te verwachten was, normaal rechtsgestreept te zijn. Zeker de helft waren jonge exemplaren. Tenslotte zonderde ik 8 stuks af, waarvan hier de gegevens volgen: 3 exemplaren op de rechterklep gestreept over niet meer dan een kleine sector. 2 exemplaren op de rechterklep gestreept met slechts een paar afzonderlijke streepjes. 1 exemplaar op de rechterklep gestreept met een sector en een paar streepjes. 1 exemplaar op de rechterklep normaal gestreept en op de linkerklep een paar afzonderlijke streepjes. 1 exemplaar ongestreept (geen verwarring met A. tenuis !)

Het zuiver linksgestreepte exemplaar, waaraan ik eigenlijk had gedacht, is blijkbaar zeldzamer dan men soms vermoedt.

D.A. Visker.