

-VERMELDENSWAARDIGE VONDSTEN

Uit een opgeheven collectie werden mij de mooiste stukken geschonken. Dit materiaal werd verzameld gedurende de jaren 1965 - 1966. Het betreft: Arca lactea L., een gaaf doublet, recent, 15½ x 7 mm, bruinrood van kleur, met resten van het periostracum (franje) op beide kleppen en met vleesresten; Katwijk. (Tebble, p. 31, textfig. 2a en b). 1)

Nucula turgida Leckenby & Marshall, 1 gaaf doublet, recent, 8 x 5½ mm, wit van tint, uit gruis van Scheveningen. Deze schelp komt geheel overeen met Tebble, p. 27, plaat 1 fig. d en textfig. 1 waarmee echter zijn fig. 14b niet zo goed overeenkomt. Dit geval is dan overeenkomstig de mening van Van der Slik, door Van Regteren Altena o.a. weergegeven in de Fossielenatlas, Basteria 26, 1962, p. 7 waarin Van der Slik stelt dat het recente Nucula-materiaal van onze kust niet tot N. nucleus behoort doch grotendeels tot N. turgida.

Dosinia exoleta (L.), een verse linker klep, 40 x 39 mm, Wassenaarseslag.

Venus verrucosa L., een verse linker klep, 40 x 35 mm, Scheveningen.

De herkomst van laatstgenoemde twee schelpen is niet te bepalen. V. Verrucosa kan bij Scheveningen van een visserijschip afkomstig zijn of uit het Kanaal. Volgens Tebble, p. 115 komt de soort in de Noordzee niet voor. D. exoleta leeft in de Noordzee. Er is op de schelpen geen spoor van begroeiing met wier of iets dergelijks te vinden.

Retusa alba (Kammacher). 5 ex., wit, gaaf met duidelijke sculptuur, uit gruis van Scheveningen.

Tenslotte werd bij bewerking van eigen materiaal aan de hand van de Fossielenatlas een rechter klop van Arca tetragona Poli gevonden, lang 4 mm, gaaf doch met fossiel uiterlijk, uit gruis van Katwijk. In de Fossielenatlas is deze soort alleen uit Zeeland genoemd.

A.W. Lacourt.

1) Norman Tebble, British Bivalve Seashells, London 1966. Trustees British Museum (Natural History).