

Archiv für Molluskenkunde, Band 98 1968

- Kempf, E.K. p. 1-22. Mollusken aus dem Holstein-Interglazial des Nieder-rheingebietes. Na een geologisch en historische inleiding worden 33 soorten kort beschreven en in 4 fotoplaten afgebeeld. Overzicht van 49 voor dit gebied gepubliceerde spp., waarvan voor 16 spp. het bewijsmateriaal ontbreekt. De bestudeerde lagen zijn rivierafzettingen. Stratigrafisch zijn Valvata naticina, Viviparus diluvianus en Pisidium sulcatum van betekenis.
- Kuiper, J.G.J. p. 23-28. Die spätpleistozänen Pisidien des ehemaligen Ascherslebener Sees. Beschrijvingen en afbeeldingen van alle gevonden Pisidium-soorten waardoor het werk van D. Mania, 1967 over dit gebied wordt aangevuld. Tabel met verticale verspreiding der soorten van Eemien tot Holoceen uit deze ten N. van de Harz gelegen vallei, vroeger een ondiep meer.
- Schlickum, W.R. p. 39-51. Die Gattungen Briardia Munier-Chlarnas und Nystia Tourneur. Nomenclatorisch overzicht en bespreking van beide genera (Hydrobiidae). Een aantal soorten werden samengebracht in Glibertiella n.gen. generotypus Cyclostoma microstoma Desh. Het genus Nystia werd beschreven met de subgenera Nystia ss. subgenerotypus Paludina duchasteli Nyst; Stadtiella n.subg. subg.typus Nystia lenoiri n.sp.; Stadtiellopsis n.subg. typus Cyclostoma rubeschi Reuss. Bithynia pseudemmericia Schütt, 1964 is subgenerotypus van Bithynia (Pseudemmericia) n.subg. Plaat 5 met foto afb. van 5 soorten.
- Schlickum, W.R. p. 53-54. Zur Nomenklatur von Staliopsis Rzehak, 1893. Staliopsis (Sandbergeriella) n. subg. voor Paludina desmaresti Prevost.
- Sajo, J.E. p. 55-56. Clausilia dubia gratiosa n.subsp. Beschreven uit Torda in Sieben-Bürgen. Foto.
- Sajo, J.E. p. 57-60. Drei neue Clausiliiden aus Griechenland. Cristataria (C.) crocea n.sp., Isabellaria (Nymphogona) praecipua n.subg.n.sp., Idyla (I.) herae n.sp. Foto's.
- Pinter, L. p. 61-63. Eine neue Wasserschnocke aus Bulgarien. Belgrandiella angelovi n.sp. Foto, alsmede van B. hessei (Wagn.) en B. pusilla Angelov.
- Schütt, H. p. 65-68. Über Pyrgula annulata (Linnaeus). De zuidoost europese Pyrgula's zijn geen Hydrobiiden maar behoren tot de Micromelaniidae. P. annulata van vindplaatsen uit Dalmatië verschilt constant met P. annulata uit Italië. Daarom werd P. annulata dalmatica n.ssp. opgesteld. Afb. van radula en verspreidingskaartje.
- Bernasconi, R. p. 71-72. Über eine Bythiospeum-Riesenform aus Frankreich (Gastropoda, Hydrobiidae). B. charpyi giganteum n.ssp. Foto.
- Schilder, F.A. p. 73-75. Zur Kenntnis der Cypraeidae. 13. Eine Mutation von Erronea erronea (Linnaeus). E. erronea azurea n.ssp. uit Broome, W. Australië. Foto.
- Caprotti, E. p. 77-84. Nota sui generi Cadulus ed Entalina nel Mediterraneo (Scaphopoda, Siphonodentaliidae). Beschrijving van de soorten uit deze geslachten in de Middellandse Zee. Voorkomen, oecologie en synonymie.
- Grossu, A.V. p. 85-90. A new species of the genus Limax in Romania. Limax tigvenius n.sp. beschreven en afgebeeld, dier en genitaal-anatomic.
- Ray, H.C. & P. Roychoudhuri. p. 91-94. On a new species of the genus Pseudononia Boettger, 1877, from Nanchik, NEFA, India. Een Clausiliide: Pseudononia (P.) loosjesiana nieuw beschreven en afgebeeld.
- Verdcourt, B. p. 95-101. Notes on Euonyma Melvill & Ponsonby in East Africa (Subulinidae). Sleutel tot drie soorten E. magilensis (Craven), E. curtissima n.sp. en E. achilles Preston. Foto's van de schelpen, genitaal-anatomic van eerste twee soorten. Opgave van andere beschreven soorten uit dit geslacht.

L.J.M. Butot.