

VONDSTEN UIT WESTKAPELLE

Op de dijk te Westkapelle werd een stuk gevaren paalhoofd geheel opgeruimd. De palen werden eruit getrokken en op de dijk gebracht. Daar werden ze ontdaan van mossels en alles wat er aanzat. Omdat er eetbare mossels bij waren, werden die uitgezocht en meegenomen. Ondergetekende nam een kleine emmer vol mee. Buiten dat kon ook het volgende verzameld worden:

+ 2000 levende Odostomia scalaris (Mac Gillivray)
2 grote Crepidula fornicata (L.)
12 zeeduizendpoten Nereis spec.

Door medewerking van Mevrouw Dr. W.S.S. van der Feen- van Benthem Jutting te Domburg, werd door Drs. W.J. Wolff, Delta Instituut, Ierseke, de volgende soorten gedetermineerd.

1 jonge noordzeekrab Cancer pagarus L.
+ 20 Ophelia borealis Quatrefages
12 Lepidonotus squamatus L.

1 Harmothoë imbricata L.
6 Lineus spec.

En door Dr. L.B. Holthuis (Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) veel kleine schaaldieren, meest Jassa falcata, maar ook Caprella en Corophium, een paar jonge strandkrabben en een klein porceleinkrabbetje.

Op het strand tussen Westkapelle en Domburg werd van de zomer gevonden (niet alles door de schrijver) 1 gave klep van vermoedelijk Panopea intermedia (J.Sow.), 1 gave klep van Panopea faujasii (Ménard), 4 gave kleppen van Bornia deltoidea (Wood) en 1 gave Sipho islandicus (Gmelin). Dit alles werd mede gedetermineerd door Mevrouw Dr. W.S.S. van der Feen - van Benthem Jutting, waarvoor mijn hartelijke dank.

Adres schrijver:

P. Slabber,
Boekhoutstraat 2A,
Westkapelle.

LITERATUUROPGAVEN UIT NIET-MALACOLOGISCHE TIJDSCHRIFTEN

- Addicott, W.O., 1970. Latitudinal studies in Tertiary molluscan fauna's of the Pacific Coast. Palaeogeogr. Palaeoclim. Palaeoec. Vol. 8: 287 - 312.
- Connell, J.H., 1970. A predator-prey system in the marine intertidal region. I. Balanus glandula and several predatory species of Thais. Ecol. Monogr. 40: 49 - 78. (Thais lamellosa, Thais emarginata, Thais canaliculata.)
- Cowen, R., 1970. Analogues between the recent bivalve Tridacna and the fossil brachiopods Lyttoniacea and Richthofeniaceae. Palaeogeogr. Palaeoclim. Palaeoecol. 8: 329 - 344.
- Eisenberg, R.M., 1970. The role of food in the regulation of the pond snail Lymnaea elodes. Ecology 51: 680 - 684.
- Eisler, R., 1970. Latent effects of insecticide intoxication to marine molluscs. Hydrobiologia 36: 345 - 352. (Mercenaria mercenaria, Nassa obsoleta).
- Frank, P.W., 1969. Growth rates and longevity of some gastropod molluscs on the coral reef at Heron Island. Oecologia 2: 232 - 250. (Trochus pyramis, Nerita albicella, Strombus luhuanus, Monetaria annulus, Mancinella tuberosa, Drupa morum, Latirolagena ragdula, Vasum turbinellus, Conus miliaris, Conus flavidus, Conus spec.).
- Ghenea, C., 1970. Stratigraphy of the upper pliocene-lower pleistocene interval in the Dacic Basin (Romania). Palaeogeogr. Palaeoclim. Palaeoec. 8: 165 - 174. (Unio studzae, Unio saratae, Unio prominulus, Unio psilodontum).
- Grossu, A.V. & Grossu, D., 1968. Oekologische Betrachtungen über die Molluskenfauna im rumänischen Sektor des Donau-Flusses und im Delta: Zusammensetzung, Gemeinschaft, Verhältnisse, Frequenz. Arch. Hydrobiol. Suppl. 34: 168 - 203.
- Popov, G.I., 1970. Significance of fresh water molluscs for correlation of continental and marine pleistocene of Ponto Caspian. Palaeogeogr. Palaeoclim. Palaeoec. 8: 251 - 260.
- Sapkarev, I.A., 1969. Distribution and the population density of Dreissena polymorpha Pall. (Lamellibranchia) in the lakes of Macedonia. Fac. Sci. Nat. Univ. Skopje Annuaire Biologie 21: 31-52.
- Wärebörn, I., 1969. Land molluscs and their environments in an oligotrophic area in southern Sweden. Oikos 20: 461 - 479.