MOLLUSKEN VAN HET BÖNNINK (WINTERSWIJK)

Op 25 en 26 mei 1968 werd Het Bönnink, een terrein van 20ha van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, door de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie geïnventariseerd. Doel van het korte onderzoek was het verkrijgen van een algemene indruk van flora en fauna in dit nog slecht bekende gebiedje. Een onderdeel van de inventarisatie, de molluskenwaarnemingen, worden hierbij iets verkort weergegeven.

-Het-

Het Bönnink ligt 1 km ten noorden van Winterswijk, ten westen van de weg naar Meddo. Het is een typisch Achterhoeks landschap, waar de Ratumse Beek doorheen stroomt. Kleine percelen weiland zijn omgeven door houtwallen en stukjes loofbos. In het noordwesten ligt een boscomplex van circa 2 ha, terwijl naast de Bönninkweg nog een oude boomgaard ligt.

Om een indruk van de aanwezige molluskensoorten te krijgen, werd het terrein te voet doorkruist, waarbij voortdurend tussen de begroeiïng gekeken werd. Allerlei voorwerpen, als takken, hout, papier en afval, werden op slakken geinspecteerd. Daarnaast werd op elf plaatsen enige tijd op één punt gezocht.

De vondsten binnen dezelfde terreintypen zijn bijeengevoegd.

Bos. Op diverse plaatsen werd in de stukjes bos gezocht. Over het algemeen was het aantal dieren gering. Als er geen ondergroei aanwezig was konden met enige moeite onder takken de drie volgende soorten gevonden worden:

Discus rotundatus	enige ex.
Arion intermedius	enkele ex.
Nesovitrea hammonis	enige ex.

Was er ondergroei aanwezig (vnl. gras, brandnetel, klimop, struiken) dan werden deze soorten algemener (vooral D.rotundatus en N.hammonis) en traden ook de volgende soorten op:

Carychium tridentatum	enkele ex.
Cochlicopa lubrica	3 ex.
Arion circumscriptus	enkele ex.
Arion subfuscus	1 ex.
Vitrea crystallina	2 ex.
Aegopinella nitidula	vrij algemeen, op één plek langs bospad onder karton
Oxychilus draparnaudi	1 leeg huisje
Deroceras laeve	1 ex.
Euconulus fulvus	vrij algemeen
Perforatella incarnata	enige ex.
Trichia hispida	enige ex.
Cepaea hortensis	enkele ex.

Boomgaard. Enige oude bomen met daaronder een dichte vegetatie van o.a. gras, brandnetel, kleefkruid. Omgeven door bos. Tussen de planten en op de grond:

Carychium tridentatum	enige ex.
Cochlicopa lubrica	algemeen
Columella aspera	vrij algemeen
Vallonia costata	1 leeg huisje
Succinea putris	1 leeg huisje
Discus rotundatus	algemeen

Arion rufus	1 ex.
Arion circumscriptus	vrij algemeen
Arion subfuscus	enige ex.
Nesovitrea hammonis	algemeen
Aegopinella nitidula	2 ex.
Oxychilus draparnaudi	4 ex.
Deroceras laeve	1 ex.
Euconulus fulvus	vrij algemeen
Perforatella incarnata	enige ex.
Trichia hispida	vrij algemeen
Cepaea hortensis	algemeen

Houtwal. De enkele keer, dat op houtwallen werd gezocht kon slechts 1 ex. van Nesovitrea hammonis tussen bladeren gevonden worden.

Open strook met veel gras, tussen houtwal en jong larixbos; o.a. op afgevallen bladeren:

Succinea oblonga	algemeen
Arion rufus	1 ex.
Arion subfuscus	enkele ex.
Arion intermedius	1 ex.

Weiland. Vooral in de vroege ochtend (dauw!) kropen hier:

Discus rotundatus	2 ex. op tak bij bosrand
Arion subfuscus	1 ex. op gras, 1 ex. op rotte biet
Deroceras laeve	1 ex. op gras, 1 ex. onder hout
Deroceras reticulatum	algemeen, veel juveniele ex.
Perforatella incarnata	1 ex, op zuring
Trichia hispida	1 ex, op tak bij bosrand
Cepaea hortensis	1 ex. op zuring

Ratumse Beek. Op verschillende plaatsen op stenen (vooral op bakstenen in de stroomversnellinkjes:

Ancylus fluviatilis	vrij algemeen

Op enkele plaatsen (in de schaduw van bomen) werd zand van de bodem van de beek doorgezeefd. Na vele malen zeven werden twee soorten mosseltjes ontdekt:

Sphaerium corneum	3 ex.
Pisidium cf. amnicum	3 juveniele ex.

Tot slot nog de vondsten van twee plekjes aan de rand van het onderzochte gebied: In een greppel tussen een weiland en een stuk bouwland kropen op de vochtige, zwarte grond: Succinea putris, zeer algemeen; Zonitoides nitidus, zeer algemeen; Arion rufus, 1 ex.; Deroceras reticulatum, 1 ex.; Dercceras laeve, 1 ex.
In een vers gegraven sloot, welke uitkwam bij een zandafgraving, kropen op de zandbodem: Galba truncatula, vrij algemeen; Radix peregra, algemeen.

W.J.Kuijper
De Lannoystraat 101, Den Haag