

VONDSTEN VAN LOLIGO-EIEREN

Eieren van de inktvissen *Loligo vulgaris* Lamarck en *L. forbesi* Steenstrup zijn ingebed in korte of lange gelatineuze strengen. Bij *L. vulgaris* 100-120 mm lang met een diameter van 10mm, bij *L. forbesi* 65-165 mm met een diameter van 10-12 mm (Muus 1959). Deze strengen zijn aan één uiteinde trosvormig samengehecht en vormen soms massa's die een emmer van 10 L. kunnen vullen. In deze gelatineuze strengen ontwikkelen de eieren zich tot embryo's die $3\frac{1}{2}$ tot 4 mm groot worden. De strengen eieren spoelen niet zo vaak aan. Ik vond een tros van *L. vulgaris* op 12-6-1972 bij Langevelder Slag en een tros van *L. forbesi* bij Katwijk op 18-11-1972. Het merkwaardige van de laatste vondst is echter dat deze geheel leeg was, (de embryo's waren uitgekomen) en de gelatineuze strengen verdroogd waren tot platte, dunne, tere linten. Men zou verwachten dat het gelatineus omhulsel van de embryo's uiterst weinig resistent is en - eenmaal leeg - snel geheel te gronde zal gaan, en dat zal normaliter ook gebeuren. Doch evenals kwallen soms tot een vlies verdrogen en zelfs konden fossiliseren, zo kan het blijkbaar ook wel eens met deze lege strengen gebeuren. Men zal zich afvragen hoe ik zo'n geval dan herken en durf te determineren. Dat is gedaan op de karakteristieke vorm van de gehele tros die bewaard gebleven is.

Litteratuur: Muus, B.J., 1959. Skallus, Sôtaender, Blaeksprutter.

Danmark Fauna 65, Gads Forlag - Kôbenhavn.

A.W.Lacourt