

OVER HET LITTORINA SAXATILIS-COMPLEX
IN WEST-EUROPA
door

A.W. Lacourt

(Uit de tijdschriften: met commentaar). Gelezen in Zoological Journal of the Linnean Society, 56/2, 1975, pp. 131-153.

In een artikel "The taxonomy of some British Littorina species with notes on their reproduction (Mollusca-Prosobranchia)" toont J. Heller aan dat het "Littorina saxatilis-complex" bestaat uit 4 verschillende soorten: L. rudis Maton, L. patula Jeffreys, L. nigrolineata Gray en L. neglecta Bean.

De naam "saxatilis" is niet toepasselijk op het west-europese materiaal: L. saxatilis zou alleen in de Middellandsche Zee voorkomen. L. saxatilis var. rudis = L. rudis Maton mag ik als bekend aannemen, met spiraalribben en groeven waarbij de groeven even breed of breder dan de spiraalribben zijn. Bij L. nigrolineata zijn de spiraalribben meer dan twee maal zo breed als de groeven. "Somme of alle groeven, bij veel ex. maar niet bij alle, zijn purperbruin of zwartachtig, Lc gekleurd". [Vertaling Lc] L. patula heeft een wijd-uitgebochte mondopening, L. neglecta eveneens,

doch deze laatste is zeer klein en heeft een kleurpatroon. Ik kan hieraan toevoegen dat ik in mijn collectie exemplaren van *L. nigro-lineata* van Normandië heb en dat deze soort ook in Nederland voorkomt: 3 ex. uit een aantal *Littorina*'s van Hoofdplaat aan de Westerschelde, 1958.

Het is een zeer lezenswaardig artikel. Het lijkt mij nuttig dat ieder zijn *Littorina*-materiaal uit West Europa hieraan toetst en het resultaat weergeeft.