

NOGMAALS VASCONIELLA JEFFREYSIANA (P. FISCHER)
(uit Bretagne, Algeciras en Algerije)

door

J.J. van Aartsen.

De beide stukjes van de heren Mienis en Verduin in CB 166 over bovengenoemde soort waren mij uit het hart gegrepen. Enerzijds omdat duidelijk werd gedemonstreerd hoe onzorgvuldig iemand als Nordsieck met de "bekende" verspreidingsgebieden van soorten om-springt. Anderzijds ook omdat blijkt hoe weinig zeker de verspreidingsgebieden en hun grenzen voor sommige soorten zijn.

In het geval van Vasconiella is de soort, voor zover ik heb kunnen nagaan, uit de literatuur bekend van Capbreton (= type-localiteit), Messanges, Hendage, Gijon en de atlantische kust van Marokko (tot Agadir, zie Verduin in CB 166: 442). Dat de soort aan de kust van de Golf van Biscaye niet zeldzaam is, bewijst de vondst van enkele tientallen klepjes in gruis van Laredo (N. Spanje).

Hoewel Nordsieck het over de Lusitanische Zee heeft als verspreidingsgebied wordt de soort noch door Hidalgo noch door Nobre van de Portugese kust genoemd. Ook in de rapporten over de resultaten van de Porcupine-expeditie wordt de soort niet genoemd. Hoe Nordsieck aan dit deel van het verspreidingsgebied komt is dan ook niet duidelijk. Desalniettemin komt Vasconiella jeffreysiana in redelijke aantallen voor bij Lagos (Zuid Portugal), waar in gruis, verzameld door ons medelid A. Zorn, enkele tientallen exemplaren werden aangetroffen.

Een verdere uitbreiding in noordelijke richting is verzekerd door 2 r. klepjes die ik zelf verzamelde in Z. Bretagne (Kerfany les Pins).

Ook in de baai van Algeciras (bij Getaris) verzamelde ik zelf een redelijk aantal kleppen. Deze baai wordt gewoonlijk reeds bij de

Middellandse Zee gerekend en is in de vorige eeuw o.a. door Jeffreys vrij goed onderzocht. Vasconiella jeffreysiana wordt echter door Jeffreys niet genoemd.

Merkwaardiger is echter het feit, dat alle recente auteurs zoals Nordsieck en Parenzan het voorkomen van Vasconiella in de Middellandse Zee volkomen negeren (of er niet mee bekend zijn!). Toch werd reeds in 1900 door Pallary het voorkomen van deze soort bij Cap Falcon, dicht bij Oran (W. Algerije) gesignaleerd. Hoewel ik zelf niet in Oran verzameld heb, kan ik wel l. l. en l. r. klep van Vasconiella melden die ik deze zomer zelf verzamelde in Sidi Ferruck (+ 20 km W. van Algiers). Deze vondst bevestigt het voorkomen aan de Algerijnse kust.

Tot slot zou ik nog een opmerking willen maken over de soort "Lepton" lepisma Mtrs. 1878. Deze soort is beschreven van slechts 1 klep, gevonden te Algiers door de bekende verzamelaar Joly. Leest men de beschrijving van Monterosato en vergelijkt die met de beschrijving van de linkerklep van Vasconiella jeffreysiana zoals gegeven door Kisch (1958), dan lijkt het mij dat deze "Lepton" lepisma Mtrs. 1878, heel goed een linker klep van Vasconiella jeffreysiana zou kunnen zijn. Zeker als we bedenken hoezeer beide kleppen verschillen en dat pas sinds 1958 bekend is dat beide kleppen bij elkaar behoren. Uiteraard kan slechts een onderzoek van het type-exemplaar zekerheid verschaffen.