STRANDJUTTEN OP TERSCHELLING

door

Egge Knol

Deze zomer vonden wij enige schelpen waarvan ik het leuk vind ze te melden. Op 22 juli vond mijn zusje Noortje tijdens een wandeltocht bij Oosterend op het strand een Pectensoort die zij meebracht naar huis. Voorlopig heb ik deze als Flexopecten flexuosus (Poli, 1795) gedetermineerd. Op 25-7-1976 vond ik aan de rand van een gruisbank met schelpkokerwormen een asgrauwe tolhoren (Gibbula cineraria (L., 1758)). Deze gruisbank lag 300 m oostelijk van de strandovergang van Formerum, 50 m verder vond ik twee Corbula gibba (Olivi, 1792) en een melkwitte arkschelp (Striarca lactea lactea (L., 1758)). Dick Hoeksema vond in deze gruisbank een

Timoclea ovata (Pennant, 1777). Op 8 augustus vond ik even westelijk van paal 18 bij een gruisbank een paardezadel (Anomia ephippium L., 1758), een spoelhoren (Acteon tornatilis (L., 1758)) en een Gastrana fragilis (L., 1758). Op 12 augustus vond mijn zusje Margriet vanaf de fiets een schelp die volgens mij een Arcopagia crassa (Pennant, 1777) is.

Het was opvallend hoeveel Eemfossielen deze zomer in het gruis zaten. Van de bovenvermelde soorten zijn dit: F. flexuosus, C. gibba, G. fragilis en A. crassa. Ook werden Lucinella divaricata (L., 1758) en Bittium reticulatum (Da Costa, 1778) vaak gevonden.

F. flexuosus, G. fragilis en A. Crassa had ik nog nooit eerder op Terschelling gevonden, hoewel ik al jaren schelpen zoek en het vrij grote schelpen waren.

Naschrift van de redaktie:

Pallary, 1920	:	Venus (Timoclea) ovata
Entrop, 1959	:	Venus ovata
Pasteur Humbert, 1962	:	Venus ovata
Tebble, 1966	:	Venus (Timoclea) ovata
Nordsieck, 1969	:	Chione (Timoclea) ovata
Entrop, 1972	:	Chione ovata
Jansen, 1975	:	Timoclea (Timoclea) ovata

U ziet het, de malacologie staat niet stil. "Stilstand is achteruitgang", lazen wij nog onlangs.

A.V.