

EEN PAREL OP HET STRAND VAN TERSCHELLING

door

Dick Hoeksema

Tijdens het uitpluizen van een monster van 230 gram fijn gruis met veel zeeëgelstekels, verzameld bij zachte N.W. wind in de buurt van paal 9,80 op 24 juli 1976, ontdekte ik tot mijn grote verrassing een prachtig pareltje.

Het exemplaar is onregelmatig bol van vorm (min of meer ellipsoïd), heeft een parelgrijze kleur (ik kan geen betere, minder dubbelzinnige omschrijving vinden) en is zacht glanzend. De grootste- en kleinste diameter bedragen respectievelijk 1,2 en 1,0 mm. Door de stereo-loupe kon ik bij 20x vergroting duidelijk een donkere kern waarnemen, waarschijnlijk een zandkorrel.

Mogelijk is een exemplaar van Aequipecten opercularis (L.) de maker van dit fraais (J. Blommers e.a., 1975, p. 72). Of ook Ostrea edulis (L.) hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden, is me niet bekend. Ik heb er

geen flauw idee van of er eerder parels op het Nederlandse strand gevonden zijn. Wel weet ik dat de heer Doeksen er eentje vond in grondmonsters genomen uit de Eemlagen onder Terschelling (G. Doeksen, 1975).

Waarmee maar weer bewezen is, dat Terschelling zijn naam "Parel der Wadden" eer aan doet!

Literatuur:

Blommers, J., J.A.C. Eikenboom, B. Entrop, W. Faber, E.D. van Kekerem, M. Mellema, G.W. Noordhoek en H. Raven. 1975. De Europese Pectinidae.- Vita Marina, Tweekleppigen: 67-128.
Doeksen, G., 1975. Eemfossielen uit waterboringen op Terschelling.- CB van de NMV, 163: 366-371.
Otjes, P.J., 1965. Parels.- Vita Marina, Tweekleppigen: 3-10.

Er zijn vele mogelijkheden: bij een groot aantal families van tweekleppigen en zelfs bij verschillende gastropoden is parelvorming geconstateerd. Zie: Coomans, H.E., 1973. Pearl formation in *Chlamys varia* from Bretagne.- *Basteria* 37: 141-143. Ondergetekende vond jaren geleden een flinke parel van *Mytilus edulis* L., niet op het strand, maar in de mond, tijdens een mosselenmaaltijd.

G.