

'REUZEN ONDER DE NERITA'S

door

Henk K. Mienis

Wanneer men het over Nerita's heeft, denkt men gewoonlijk aan die kleine; 0.5-2.5 cm, vaak bontgekleurde slakjes, die dikwijls in enorme aantallen aanwezig zijn in de littorale zone van bijna elke tropische of subtropische kust.

Minder bekend is het feit dat diverse Nerita-soorten een vrij behoorlijke afmeting kunnen krijgen. Wagner & Abbott (1967: 280) vermelden bijvoorbeeld uit de verzameling van het Brits Museum van Natuurlijke Historie (Londen) een Nerita ornata Sowerby, 1823

(een soort die beter bekend staat als N. scabricosta Lamarck, 1822) van Panama met een grootte van 54.3 mm. Dat dit geen uitzondering is bewijzen enkele exemplaren van deze soort afkomstig van de Galapagos eilanden in de verzameling van de schrijver. Alhoewel kleiner, bewegen zij zich toch allen tussen de 45 en 50 mm.

Onlangs kon ik echter nog grotere Nerita's bestuderen. In de verzameling van het Zoölogisch Museum in Kopenhagen bevinden zich twee exemplaren van Nerita textilis Gmelin, 1791 (synoniem N. plexa Dillwyn, 1817), die afkomstig zijn van de kust van Tranquebar. Zij hebben een maximale doorsnede van respectievelijk 56.8 en 56.6 mm en zijn daarmee waarschijnlijk een van de grootste, zo niet de grootste vertegenwoordigers van het geslacht Nerita.

Ik dank Dr. J. Knudsen (Kopenhagen) voor inzage van het boven vermeldde materiaal van Nerita textilis.

Literatuur:

Wagner, R.J.L. & R.T. Abbott, 1967. Van Nostrand's Standard Catalog of Shells, 2nd Ed. 1-303. Princetown.