

VOGELS EN LANDSLAKKEN

door

L.J.M. Butot

Bij het doorwerken van zijn vogelwaarnemingen van het afgelopen jaar 1978 kwam D.A. Jonkers (R.I.N.- Leersum) een waarneming tegen die hij op mijn tafel deponeerde.

"Op 12 april 1978 zag ik in het Eysderbos onder de gemeente Sint Geertruid een boomklever (Sitta europaea) die van de grond opvloog. De vogel had een ca 1 cm grote huisjesslak in de snavel en voerde het dier mee. De slak was een Cepaea-soort. Op dezelfde plaats vond ik enkele exemplaren van Cepaea nemoralis op de grond rondkruipen. In de omgeving was een andere boomklever aan het baltsen."

Op de waarnemingsdatum hadden de boomklevers nog geen jongen. In het Handbook of British Birds vol. 1, p. 242 wordt gemeld dat boomklevers zaden, waaronder hazelnoten, eten, maar ook spinnen en kleine slakken. Als de vogels hazelnoten kunnenopenhakken zullen zij met onze Cepaea-soorten ook wel weg weten en na bewerking het dier kunnen consumeren. Daar de heer Jonkers bekend is met onze twee Cepaea-soorten en hij ter plaatse Cepaea nemoralis aantrof, mogen we aannemen dat de door de vogel meegevoerde slak tot dezelfde soort behoorde.

Het verliezen van deze toch vrij grote huisjesslakken door fouragerende vogels zal weinig bijdragen tot de verdere verspreiding van landslakken omdat de afgelegde afstanden nooit groot zullen zijn.