BIJ ENKELE FOTO'S

Van verschillende kanten is er gevraagd om meer foto's in het CB. Naar aanleiding daarvan bood de heer Gittenberger enkele bijzondere foto's aan. Laat anderen die iets leuks te vertonen hebben dit goede voorbeeld volgen.

Redactie.

Verklaringen van de afbeeldingen:


Fig. 1, 2. Enige tijd terug demonstreerde de heer J. Berkhout tijdens een NMV-vergadering enkele doorsneden van Cassis schelpen. Hij constateerde bij C. cornuta, C. flammea en C. tuberosa, dat de slakken het scheve siphokanaal, dat samen met iedere verdikte mondrand gevormd wordt, alvorens verder te groeien niet afbreken, maar eenvoudig inkapselen. Zo zien we niet alleen aan de buitenkant bij deze schelpen een aantal oude verdikte mondranden (varices; enkelvoud: varix), maar kunnen we ook binnenin de daarmee corresponderende oude scheve siphokanalen nog terugvinden. Vandaar de typische verbreding in de onderste helft van de columella. (Foto's B. Entrop; welwillend ter beschikking gesteld door de Stichting Zeebiologisch Museum, Ten Haag.)

Fig. 3. Geruime tijd geleden ontving het R.M.N.H., Leiden, deze afbeelding van een vertegenwoordiger van de Cardiidae, begroeid met een zeepok, die met verbluffende nauwgezetheid de sculptuur van de schelp nabootst. Helaas kan de maker van deze fraaie foto hier niet de hem toekomende eervolle vermelding gegeven worden, aangezien zijn naam tot schande van ondergetekende onvindbaar bleef.


Fig. 4,5. Er bestaan maar weinig afbeeldingen van reuzeninktvissen, zodat het zinvol leek om de in het R.M.N.H. archief berustende foto van een Architeuthis dux Steenstrup, uit de Trondheimsfjord, hier eens af te drukken. Het dier heeft een lichaamslengte van 2,14 m, terwijl de grote tentakels 7,10 m lang zijn. Ter vergelijking een afbeelding van de grootste van het Nederlandse strand bekende inktvis, die ruim 1 m lang kan worden, Ommastrephes sagittatus (Lamarck), naar een exemplaar van Westkapelle (1 V 1964). (Foto's door ?)

Fig. 6. Detail van de huid van het voorste gedeelte van de kop van een in 1970 nabij Breskens aangespoelde potvis. Duidelijk zijn de ringvormige littekens te zien, veroorzaakt door zuignappen van reuzeninktvissen en herinnerend aan bizarre gevechten onder water. De ringen zijn ongeveer 1,5 cm in doorsnede. (Foto F.J.C. Gittenberger.)


E. Gittenberger




1




2




3



4



5



6