# NOG MEER PARELS

door

A. Stiva

In aansluiting op het artikel van J.G.J. Kuiper over parels (CB 194) kan ik nog de volgende aanvullingen geven.

Jaren geleden mocht ik op een der vergaderingen der NMV een demonstratie geven met parels, gevonden in kanariezand van de Fa Sluis. Dat was de enige leverancier van schelpzand, die zoveel parels in zijn kanariezand deed. Uit twee busjes zand kwamen 8 parels te voorschijn, plus nog een aantal Bittium reticulatum en diverse Rissoidae, welke tot dusver nog niet op naam werden gebracht. Navraag naar de herkomst van het schelpzand bij de leverancier gaf - na veel aarzelend geantwoord - het volgende resultaat: het zand kwam uit een Miocene zandgroeve uit Denemarken. De schelpen werden later bijgemengd, maar men wist er verder niets van te vertellen. Om geen angst te wekken bij de leverancier werd toen ook maar niet verder aangedrongen.

Ook in het Eemien in de omgeving van Amsterdam (opgespoten terreinen) zijn wat parels gevonden. Waar deze gebleven zijn is niet bekend. Ook in het Miocene materiaal van Miste kan men met een beetje geluk parels vinden, zelfs tot enige millimeters groot.

Blisterparels kan men vaak aantreffen in bivalven, meestal bizar gevormd en vaak nog met de oorzaak van de parelvorming erin.

Wat mevrouw Gerhardt gebeurde is mij ook een maal overkomen. Verder alle hulde voor de Pisidium waldeni, welke -gezien zijn afmeting - toch een geweldige parel moest meeslepen.