WEDEROM CAECUM CLARKII, CARPENTER, 1858

door

A. Stiva

Uit het reeds eerder genoemde gruis van Corbière Point, Jersey (Stiva, 1983) zijn nu meerdere exemplaren van C.clarkii gekomen. Alle voorzien van periostracum, maar zonder dierresten of operculum. Tevens werden uit een gruismonstertje, van St. Ouens Bay, Jersey, een paar lege schelpjes verzameld en nog al wat fragmenten. Helaas zijn deze exemplaren door Postaal geweld vermorzeld en alleen nog chemisch aan te tonen. Mede gezien de mededeling van J.v.d. Linden (1983), die 2 exemplaren van C.clarkii heeft gevonden in gruis van Trébeuren, France, blijkt C.clarkii niet zeldzaam te zijn in de omstreken van St. Malo en was 1982 een goed C.clarkii jaar.

BIBLIOGRAFIE

HOEKSEMA, D.F., 1981. Caecum clarkii Carpenter, in the Channel Islands, Great Britain: an extension of the known distribution to the North.- Basteria 45: 66.

HOEKSEMA, D.F., 1982. Caecum clarkii Carpenter, 1858 ook uit bouwzand in N. Bretagne.- Corr. Bl. NMV 205:1239-1240.

STIVA, A., 1983. Caecum clarkii, Carpenter, 1858 op Jersey (CI).- Corr. Bl. NMV 210: 1333.

LINDEN, J.v.d., 1983. Nogmaals Caecum clarkii.- Corr. Bl. NMV 210: 1338.