OVER ORCULELLA BULGARICA (HESSE, 1915) IN TURKIJE

door

Ruud Bank

Naar aanleiding van vondsten van Orculella bulgarica in kwartaire afzettingen van Spanje werd door Gittenberger (1983: 332-334) een overzicht gegeven van de hem tot dan toe bekende vindplaatsen van deze soort. Turkije wordt hierin niet genoemd. In een publikatie van Schütt (1985: 189) wordt bovengenoemde soort vermeld uit kaenozoïsche afzettingen 6 km oostzuidoost van Burdur (Vilayet Burdur, West-Anantolië, Turkije). De ouderdom van deze afzettingen wordt geschat op boven-plioceen/midden-pleistoceen. Ook Schütt kende geen literatuuropgaven van Orculella bulgarica uit Turkije, vandaar zijn opmerking 'Dabei ist es verwunderlich, dass diese bis jetzt nur lückenhaft bekannte Art jetzt auch fossil in Westanatolien gefunden wurde, was auf früher weitere Verbreitung hinweist.'

Beide auteurs zien aldus een tweetal vondsten van Forcart (1957: 91) over het hoofd. Hij vond de soort in 'Untere Lagen des Kalktuffes an der Bozkurt Cadessi bei der Altiparmak Okula' (Hisar, Vilayet Bursa, noordwestkust

van Anatolië, Turkije). Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze 'Kalktuffen' postglaciale afzettingen. Tevens verzamelde Forcart in mei 1936 de soort bij Paşa Fabricasi in de omgeving van Sivas op een hoogte van 1400 m (Vilayet Sivas, klein-Armenië, Turkije). Door deze laatste vondst is Orculella bulgarica ook recent uit Turkije bekend.

LITERATUUR

FORCART, L., 1957. Verzeichnis der von Prof. M. Pfannenstiel in Kalktuffen in Bursa und dessen Umgebung 1955 gesammelten Mollusken. In: M. Pfannenstiel & L. Forcart, Das Quartär der Levante IV. Der Klaktuff von Bursa.- Abh. Akad. Wiss. Lit., math.-nat. Kl. 3: 90-95.

GITTENBERGER, E., 1983. Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea IX. Nochmals über Orculidae.- Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Ser. C, 86(3): 325-342.

SCHUTT, H., 1985. Känozoische Landschnecken der Türkei. (Känozoikum und Braunkohlen der Türkei, Nr. 25).- Arch. Moll. 115(4-6): 179-223.