

SOORTENLIJST

Samengesteld aan de hand van gegevens verstrekt door J.de Boer, Th.de Boer, A. Hovestadt, A. van Peursen en T. de Winter.

Anodonta cygnea (Linné): 14.

Pisidium spec.: 10.

Sphaerium corneum (Linné): 15, 16, 17.

Sphaerium lacustre (Müller): 15.

Viviparus contectus (Millet): 15.

Valvata cristata Studer: 7, 15.

Valvata piscinalis (Müller): 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Bithynia tentaculata (Linné): 12, 14, 15, 16.

Bithynia leachi (Sheppard): 17.

Physa fontinalis (Linné): 14, 16, 17.

Physa acuta Draparnaud: 12, 14, 15, 17.

Aplexa hypnorum (Linné): 6.

Lymnaea stagnalis (Linné): 15.

Stagnicola palustris (Müller): 10, 13, 14, 15.

Stagnicola spec.: 11, 16, 17.

Radix auricularia (Linné): 12, 14, 17.

Radix ovata (Draparnaud): 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Planorbis planorbis (Linné): 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16.

Anisus vortex (Linné): 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16.
Bathyomphalus contortus (Linné): 6, 10, 15, 16.
Gyraulus albus (Müller): 9, 12, 13, 15.
Armiger crista (Linné): 7.
Hippeutis complanata (Linné): 13, 14, 15.
Planorbarius corneus (Linné): 6, 9, 10, 14, 15, 16.
Acroloxus lacustris (Linné): 12, 15.
Carychium minimum Müller: 15.
Cochlicopa lubrica (Müller): 7, 11.
Vertigo antivertigo (Draparnaud): 15.
Discus rotundatus (Müller): 2, 4, 6, 7.
Arion rufus (Linné): 3, 5, 6, 8, 9, 11.
Arion (Carinarion) sp. (juv.): 10, 11.
Arion subfuscus Draparnaud: 1, 3, 4, 5, 9, 11.
Arion intermedius Normand: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11.
Nesovitrea hammonis (Strom): 4, 7, 9, 11.
Oxychillus alliarius (Müller): 4, 6, 7, 8, 11.
Oxychillus cellarius (Müller): 11.
Zonitoides excavatus (Alder): 4.
Zonitoides nitidus (Müller): 10, 15.
Limax maximus Linné: 9, 11.
Lehmannia marginata (Müller): 4, 7.
Deroceras laeve (Müller): 5, 6, 15.
Deroceras reticulatum (Müller): 6, 10, 11, 14.
Euconulus fulvus (Müller): 7.
Euconulus alderi (Gray): 15.
Trichia hispida (Linné): 10, 11.
Arianta arbustorum (Linné): 11.
Cepaea nemoralis (Linné): 11.

N.B. Sinds enige tijd is duidelijk, dat "Stagnicola palustris" ook in Nederland uit minstens twee soorten bestaat, nl. S. corvus (Gmelin) en S. palustris (Müller): (Van der Velde & Van Kessel, Zoöl. Med. Leiden, 58: 341-352, 1984). Voor een zekere determinatie is vooralsnog dissectie van het genitaalapparaat noodzakelijk. Recentelijk is de zaak nog gecompliceerder, doordat Falkner (Heldia, 1(2): 47-50, 1985) een derde soort: S. turricula (Held) onderscheidt. Deze lijkt wat betreft de bouw van zijn geslachtsapparaat het meest op S. palustris. Het is nu niet duidelijk of alle door Van der Velde & Van Kessel tot S. palustris gerekende exemplaren ook werkelijk tot deze soort behoren, omdat de door hen gebruikte kenmerken S. turricula niet uitsluiten.

Van een aantal Friese vindplaatsen kon ik exemplaren anatomisch onderzoeken. Alle bleken tot S. palustris sensu Falkner te behoren, ondanks soms aanzienlijke verschillen in de grootte van de schelp. Niet anatomisch onderzochte populaties zijn als Stagnicola spec. in de lijst opgenomen.