

DRIJVENDE VOORWERPEN, RIEMWIER EN KNOTSWIER

door

E. de Wit

Op de vroege tocht naar Huisduinen op 5 augustus 1988 wordt mijn pad gekruist door een wezel. Een groep scholeksters en sterns staat op verandering van het getij te wachten.

Mijn doel is om vooral de voetjes van de aangespoelde riemwieren te snijden en te verzamelen van het wierhoofd Den Helder tot de Hondsbossche Zeewering nabij Petten: een afstand van 25 kilometer. Soms is er zoveel riemwier op het Noordzeestrand beland, dat men nauwelijks enkele honderden meters strand per dag kan onderzoeken. Zo kan twee kilometer zoeken langer lijken dan zes kilometer bijvoorbeeld.

Door mij werd in de periode van 5 augustus tot 9 oktober 1988 verzameld:

op riemwier:

Patella vulgata : 120 exemplaren, waarvan 1 exemplaar juveniel en 3 exemplaren levend (het grootste exemplaar 6,5 cm).

Patella depressa: 8 exemplaren (leeg).

Patella aspera : 10 exemplaren, waarvan 1 juveniel exemplaar levend op een schaalhoren.

Helcion pellucidum: 17 exemplaren (levend).

Acmaea virginea : 3 exemplaren (levend).

Gibbula spec. : 2 fragmenten.

Aequipecten opercularis: 3 doubletten (levend).

Acanthochitona crinita : 1 juveniel exemplaar (levend) op schaalhoren.

Mytilus edulis: 3 juveniele doubletten (levend).

Mytilus galloprovincialis: 1 exemplaar (levend) (TEBBLE, 1976:

"M. galloprovincialis is probably a race or variety of M. edulis")

Musculus marmoratus : 6 doubletten (levend).

Musculus costulatus : 1 doublet (levend).

Modiolus modiolus : 3 doubletten (levend), waarvan het grootste doublet 3,5 cm).

Anomia squama : 1 klep.

Cingula semistriata : 1 exemplaar (levend).


op knotswier:

Patella vulgata : 2 exemplaren (leeg).


op een rubberen ring:

Modiolus modiolus : 10 juveniele doubletten (levend).

Anomia squama : 3 doubletten (levend).



Acanthochitona criniata (juveniel)



Patella aspera (juveniel)