FERRISSIA WAUTIERI IN ZUID-HOLLAND

door

R.G. Moolenbeek

De verspreiding van Ferrissia wautieri (Mirolli, 1960) in Nederland is nog lang niet volledig bekend. Vanwege de gelijkenis met Acroloxus lacustris (L.) en Ancylus fluviatilis Müller zijn foutieve determinaties niet uitgesloten. In 1988 ontving het Zoölogisch Museum van Amsterdam (ZMA) een groot deel van de verzameling van het Zoölogisch Museum Utrecht, welk museum haar collecties door bezuinigingen moest afstoten. Bij het registreren en opbergen van dit, voornamelijk door Utrechtse studenten,bijeengebracht Nederlands materiaal heb ik de monsters van Acroloxus en Ancylus nader bekeken. Het resultaat was, dat in een monster met enige honderden Acroloxus lacustrus één ancyloied exemplaar van Ferrissia wautieri werd gevonden. Het exemplaar heeft een lengte van 2.6 mm en een breedte van 1.6 mm. De vindplaats is Reeuwijkse Plassen, Zuid-Holland, verzameld in augustus 1972 door J. van Duuren en W. Segeren. Van der Velde & Hadderingh (1981) noemen twee andere vindplaatsen in Zuid-Holland, n.l. Hoogmade en Leiden.

Summary: In the former collection of the Zoölogisch Museum Utrecht, now in ZMA, one specimen of Ferrissia wautieri was found, misidentified as Acroloxus lacustris. It originates from the Reeuwijkse Plassen in the province Zuid-Holland.

Literatuur

VAN DER VELDE, G. & R.H. HADDERINGH, 1981. De verspreiding van Ferrissia wautieri (Mirolli)(Gastropoda, Ancylidae) in Nederland. - Basteria, 45 (4-5): 67-70.