

**EEN TWEEDE EXEMPLAAR VAN BANKIVIA FASCIATA UIT DE RODE ZEE
(GASTROPODA: TROCHIDAE)**

door

Henk Dekker

Barash et al. vermeldten in 1980 de vondst van één exemplaar *Bankivia fasciata* (Menke, 1830) in de Rode Zee. Deze eerste vermelding voor de Rode Zee was gebaseerd op een exemplaar verzameld nabij Eilat in de Golf van Akaba.

Een monster van kleine soorten mollusken, uit gruis uitgesorteerd was aan mij gezonden voor determinatie van de aanwezige soorten door mevrouw A. H. Kamphuis-Hensel uit Eindhoven. Dit gruis monster was verzameld in september 1993 tijdens laag water op het strand van Na'ama Bay (= Marsa el-At), enkele kilometers noord van Sharm al-Sheik in de Sinaï, Egypte.

Bij het determineren kwam ik een exemplaar tegen van een voor mij onbekende soort voor de Rode Zee. Bij nadere bestudering van literatuur bleek deze soort te behoren tot *Bankivia fasciata* (Menke, 1830). Vergelijking met ander materiaal van deze soort bevestigde de determinatie. Het is één juveniel exemplaar met een paarsbruine kleur met lichte slijtage sporen. De afmetingen zijn 3,8 mm lang en 1,9 mm breed.

De normale verspreiding van deze soort is zuidoost Australië; Nieuw Zuid-Wales, Victoria, Tasmanië en Zuid-Australië (Wilson, 1993:91, pl. 9 figs. 9A-9J). Het is hier een zeer algemene soort die bij verzamelaars goed bekend is door zijn zeer variabele kleurpatroon.

Hoe komt deze soort nu in de Golf van Akaba? De laatste jaren heeft het scuba duiken een grote populariteit gekregen. Zo ook in de noordelijke Rode Zee zijn er veel mogelijkheden voor duikers om de zeer fraaie koraalriffen te bewonderen. Vanuit Na'ama Bay vertrekken dagelijks bootjes met duikers naar de diverse interessante riffen in de omgeving. Ik neem nu aan dat het exemplaar van *Bankivia fasciata* in Na'ama Bay terecht is gekomen via één van de duiktoeristen die eerder zuidoost Australië heeft bezocht. Het exemplaar kan bijvoorbeeld aan een duikuitrusting zijn blijven hangen en vervolgens tussen de Rode Zee soorten in de gruisbank zijn beland. In het gruismonster werden geen andere typisch Australische soorten aangetroffen.

Barash et al. kwamen tot de conclusie dat het exemplaar van Eilat waarschijnlijk was aangevoerd. Door de vondst van slechts twee exemplaren lijkt het niet waarschijnlijk dat deze soort in de Golf van Akaba levend is aan te treffen.

Summary

In 1980 Barash et al. recorded the first specimen of *Bankivia fasciata* (Menke, 1830) from the Red Sea, Gulf of Aqaba, Elat. A shell grit sample was collected by Mrs A. H. Kamphuis-Hensel in Na'ama Bay, north of Sharm al-Sheik in the Sinai. After sorting, this sample was sent to me for identification and was found to contain one specimen of *Bankivia fasciata*. It is a purplebrown juvenile specimen measuring 3.8 mm in length and 1.9 mm wide. The normal distribution of this species is Australia; New South Wales, Victoria, Tasmania and Southern Australia (Wilson, 1993:91). This second record for the Red Sea and Gulf of Aqaba in particular is therefore remarkable. Daily boats with scuba-divers leave Na'ama Bay to visit the coral reefs in the neighbourhood. It is suggested that the *Bankivia* specimen arrived here accidentally with diving tourists which visited southeast Australia before.

Literatuur

- Barash, A., Z. Danin & I. Yaron, 1980. *Bankivia fasciata* (Menke, 1830) in the Gulf of Aqaba. -Boll. Malac. 16(1-2):21-22.
Wilson, B. R., 1993. Australian marine shells, prosobranch gastropods part one. 1-408. Kallaroo.

Adres van de schrijver:
Scheidersweg 1
1731 LX Winkel.