

NOG IETS OVER ISLA MARGARITA, VENEZUELA

door

Thijs W. de Boer

In maart 1994 heb ik met mijn vrouw een kort bezoek aan Isla Margarita, een eiland voor de Venezolaanse kust, gebracht. In grote lijnen zijn mijn ervaringen op malacologisch gebied dezelfde als die van P. Hessel (1985) in zijn artikel: "Een Zuidamerikaans pareltje". Enkele soorten die hij in dat artikel vermeldt heb ik echter in het geheel niet gevonden, terwijl ik soorten heb aangetroffen die niet in bovengenoemd artikel worden genoemd. Voor een kaartje van het eiland, zie het betreffende artikel.

Onze uitvalsbasis was **Juangriego**, een rustig stadje aan de noordwest-zijde van het hoofdeiland (kaartje: nr. 1). De stad is gelegen aan een grote baai met een mooi zandstrand. In de baai liggen vele vissersbootjes, sommige in gebruik als rustplaats voor de bruine pelikanen. Op het strand hier vonden we o.m. *Periploma margaritaceum* (Lamarck, 1801), *Phyllonotus margaritensis* (Abbott, 1958) met roze of oranje mondopening en enkele *Anadara*-soorten: *A. brasiliiana* (Lamarck, 1819), *A. chemnitzii* (Philippi, 1851) en *A. ovalis* (Bruguère, 1789). Ook liggen hier veel wervels van haaien en in een handje gruis vond ik zowaar een verse haaietand.

Wie de moeite neemt om een kilometer of twee naar het westen te wandelen komt terecht op een heel smal strand, vlak langs de weg naar La Guardia. Ten tijde van ons bezoek lagen hier rijke gruisbanken met daarin vooral vele kleine soorten. Opvallende, wat grotere soorten die je hier kunt vinden zijn o.m. *Astraea brevispina* Lamarck, 1822 met een opvallend oranje-rood navelcallus), *Chicoreus brevifrons* (Lamarck, 1822), *Turritella variegata* (Linné, 1758) (fig. 1), *Cymatium parthenopeum* (Von Salis, 1793) en *Fusinus closter* (Philippi, 1850) (fig. 2). Van de iets kleinere soorten zijn b.v. *Persicula interruptolineata* (Mühlfeldt, 1816), *Crucibulum auricula* (Gmelin, 1791), *Prunum prunum* (Gmelin, 1791) (fig. 3) en *Siphonaria pectinata* (Linné, 1758) algemeen. Eén van de meest algemene tweekleppigen hier is *Noetia bisulcata* (Lamarck, 1819), maar ook soorten als *Diplodonta semiaspera* (Philippi, 1836) en *Prothotaca granulata* (Gmelin, 1791) liggen er voor het oprapen. Heel opvallend (vanwege hun felle kleuren) zijn de *Tricolia*-soorten *T. bella* (Smith, 1937), *T. tessellata* (Potiez & Michaud, 1838) en *T. affinis* (Adams, 1850) en de felgroen gekleurde *Smargadina viridis* (Linné, 1758). Minder algemene soorten hier zijn b.v. *Pacipecten bavayi* (Dautzenberg, 1900), *Iselica anomala* (Adams, 1850) en *Strombina pumilio* (Reeve, 1859).

Even voorbij La Guardia begint het lange strand van La Res-tinga. Op dit punt (nr. 5 op het kaartje van Hessel) troffen we o.m. kleppen van *Barnea truncata* (Say, 1822) en *Pholas campechensis* Gmelin, 1791 aan, de laatste vaak met roze kleurbanden. Ook vonden we hier enkele schelpen van *Fasciolaria tulipa* (Linné, 1758).

Halverwege dit strand (ongeveer tussen de nummers 5 en 6 op het kaartje van Hessel) troffen we een rijk gevulde vloedlijn aan. Deze bestond voor het overgrote deel uit kleppen en doubletten van de soort *Tivela mactroides* (Born, 1778) (fig. 4), met daartussen felrode doubletten *Tellina punicea* Born, 1778 (fig. 5), grote doubletten *Pitar dione* (Linné, 1758) (helaas met nauwelijks of geen stekels), doubletten *Prothotaca granulata* (Gmelin, 1791) en doubletten *Anadara brasiliiana* (Lamarck, 1819). Tussen dit alles een

veelvoud aan losse kleppen van deze en andere soorten. Gastropoden lagen hier nauwelijks.

Boca de Pozo (kaartje: nr. 7) was voor ons de vindplaats van een hele grote *Fasciolaria tulipa* (Linné, 1758), vele felgekleurde *Strombus pugilis* Linné, 1758, paarse en gele *Chama macerophylla* (Gmelin, 1791), kleppen *Solen obliquus* Spengler, 1794 (fig. 6) en *Mactrellona alata* (Spengler, 1802) en doubletten *Pteria colymbus* (Röding, 1798) (fig. 7). *Strombus pugilis* Linné, 1758 en mogelijk ook andere soorten zijn afkomstig van de visserij.

Manglillo (kaartje: tussen nr. 7 en nr. 8) leverde niet zoveel soorten op, maar wel o.m. een eikapsel van *Fasciolaria tulipa* (Linné, 1758).

Langs het strand van El Yague (kaartje: tussen nr. 3 en nr. 4) en El Agua (noordoosten van het eiland) tenslotte vonden we maar heel weinig mollusken.

In het fijne gruis van Juangriego bevindt zich een aantal vnl. kleine soorten, waarvan het me tot op heden niet is gelukt ze te determineren.

Het eiland is in malacologisch opzicht zeker een bezoek waard, waarbij aangetekend kan worden dat de laagste prijs voor een combinatie van vlucht (Martinair) en een week verblijf in een hotel momenteel rond de fl. 1.000,- ligt. De kosten van levensonderhoud en vervoer zijn ook laag.

Literatuur

Hessel, P., 1995. Een Zuidamerikaans pareltje. Corresp.-blad Ned. Malac. Ver., 285: 100 - 102.



Fig. 1.

Turritella variegata (Linné, 1758)




Fig. 2

Fusinus closter (Philippi, 1850)




Fig. 3. *Prunum prunum* (Gmelin, 1791)




Fig. 4. *Fivela mactroides* (Born, 1778)




Fig. 5. *Tellina punicea* Born, 1778




Fig. 6. *Solen obliquus* Spengler, 1794




Fig. 7. *Pteria colymbus* (Röding, 1798)