

BOFILIELLA IN SPANJE EN FRANKRIJK

door

R.H. de Bruyne

Zoals bekend bij alle landslakken-verzamelaars en aangegeven in standaardwerken als Kerney, Cameron & Jungbluth (1983), komen in Europa nog twee relict-vertegenwoordigers voor van de in het Tertiair algemene subfamilie *Laminiferinae* der *Clausiliidae*. Beide soorten, *Laminifera pauli* (Mabille, 1865) en *Bofiliella subarcuata* (Bofill, 1897) zijn endemisch in de Pyreneeën. De eerstgenoemde is plaateijk niet zeldzaam. *Bofiliella* vinden daarentegen, geldt als een echt buitenkantsje. Met name de (voornamelijk ondergrondse) leefwijze is de oorzaak dat ook op bekende vindplaatsen, zoals onder meer aangegeven in Loosjes & Altimira (1970) en Bech (1990), vaak tevergeefs naar de soort wordt gezocht.

Ook tijdens mijn afgelopen vakantie in de oostelijke Pyreneeën (mei 1996) heb ik tevergeefs een aantal bekende vindplaatsen afgezocht. Geluk had ik uiteindelijk bij het nauwkeurig uitpluizen van aanspoelsel van de rivier Manol, vlakbij het plaatsje Avinyonet, ten westen van Figueras. Hier trof ik zowel enkele volwassen huisjes aan, als twee 'topjes' (Fig. 1b; pag. 90), die zoals bekend door deze soort worden afgeworpen. Bij het zoeken naar het juiste aanspoelsel bleek mijn 'mariene-gruis-zoek-ervaring' goed van pas te komen; alleen in één qua samenstelling afwijkend aanspoelsel-lijntje was de soort aanwezig. Het overige aanspoelsel (nog uren gezocht en zakken vol meegenomen) bevatte geen *Bofiliella*.

Het bleef echter niet bij deze vondst. Bij het uitzeven van strooisel op een lokatie 500 meter ten zuidwesten van het gehucht Le Tech in Frankrijk (oost van Prats-de-Mollo), trof ik onverwacht ook een adult huisje van *Bofiliella* aan (Fig. 1a; pag. 90). Voor zover mij bekend, is dit pas de tweede maal dat de soort 'in situ' (dus niet aangevoerd in aanspoelsel) op Frans grondgebied is aange- troffen. De eerste vondst stamt eveneens uit het dal van de Tech en werd gedaan nabij Arles-sur-Tech (Gittenberger et al., 1980). Daarnaast is de soort nog gevonden in aanspoelsel in de Gorges de la Fou (mond. med. Th. Ripken). Conclusie: *Bofiliella* leeft op meerdere plaatsen in Frankrijk in en om de Techvallei. Met dank aan J. Eikenboom, W. Maassen, Th. Ripken en A. Hovestad voor diverse Pyreneeën-vindplaatsen

Summary

Bofiliella subarcuata (Bofill, 1897) is recorded from Avinyonet, Spain; 4 adult and 2 juvenile shells in floodline debris of the River Manol, and also from France; 1 shell, 500 m SW of village Le Tech, ca. 4 km E of Prats-de-Mollo (both May 1996). (See also p.90).

Literatuur

- Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol. luscus terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, no 12. Barcelona 229 pp.
- Gittenberger, E., H.P.M.G. Menkhurst & J.G.M. Raven, 1980. New data on four European terrestrial gastropods. *Basteria* 44 (1-4): 11 - 16.
- Kerney, M. P., R. A. D. Cameron & J. H. Jungbluth, 1983. Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Hamburg 384 p.
- Loosjes, F.E. & C. Altimira Aleu, 1970. Notes concernant *Laminifera* (*Bofilliella*) *subarcuata* (Bofill). *Basteria* 34 (3-4): 55 - 57.