

## EEN AANVULLEND BERICHT OVER SLAKKEN IN HEERHUGOWAARD

door

H.K. Mienis

Met belangstelling heb ik het artikel van Burger betreffende enige slakken in Heerhugowaard gelezen. Mijn interesse ging vooral uit naar zijn opmerkingen betreffende de Gras- en Duinslakken (respectievelijk *Candidula* en *Cernuella*), daar ik al heel lang de verspreiding van deze soorten probeer te volgen.

Ofschoon Grasslakken van oudsher bekend zijn uit de duinstreek, moeten zij elders in Noord-Holland als gebiedsvreemde fauna-elementen beschouwd worden. Wat dat betreft staan zij op één lijn met de vier allochtone Duinslakken, die tot nog toe in Noord-Holland zijn gevonden. Al deze zes soorten: *Candidula intersecta*, *Candidula gigaxii*, *Cernuella virgata*, *Cernuella cisalpina* (= *jonica*), *Cernuella aginnica* en *Cernuella neglecta*, gedragen zich in nieuwe gebieden (vooral tuinen en plantsoenen in nieuwbouwwijken en taluds van dijken, snelwegen en spoorlijnen) dan ook als exoten en kunnen in een zeer korte tijd enorm grote populaties stichten. Deze populaties houden soms enkele jaren stand om daarna als het ware (schijnbaar) weer te verdwijnen. Meestal blijven in het gebied kleine rest populaties achter (vaak in privé-tuinen, waar het moeilijk zoeken is), die na enige tijd weer een bron kunnen zijn van een nieuwe populatie-explosie.

Volgens mijn eigen waarnemingen in Groot-Waterland (Mienis, 2000) en elders in Noord-Holland kunnen Gras- en Duinslakken overal in de nieuwbouwwijken plotseling opduiken, maar ook zo weer verdwijnen. Dat Burger sinds 1985 in de omgeving van zijn woning in Heerhugowaard geen levende *Cernuella* en *Candidula* heeft waargenomen is dus niet zo verwonderlijk. Toch zijn een deel van de soorten niet uit Heerhugowaard verdwenen. Op 29 april 1994 heb ik namelijk *Candidula intersecta* en *Cernuella virgata* respectievelijk op één en acht vindplaatsen in de zogenaamde Molenwijk van Heerhugowaard levend aangetroffen. Op alle vindplaatsen kwam ook de Segrijnslak *Cantareus* (*Cryptomphalus*) *aspera aspera* voor.

In de meeste nieuwbouwwijken worden Gras- en Duinslakken vooral in plantsoenen aangetroffen, die meestal door de gemeentes aangelegd en onderhouden worden. Mijn vraag luidt: Waar halen de gemeentes het 'groen' in deze plantsoenen vandaan? Het ligt namelijk voor de hand dat de slakken met de planten uit deze kwekerijen overgebracht worden.

### Summary

Additional note on snails in Heerhugowaard. According to the observations of Burger introduced

snails of the genera *Candidula* and *Cernuella*, which were present in gardens and shrubberies in one of the new suburbs of Heerhugowaard, Noord-Holland, since the 70s, have not been found alive since 1985. However, according to my own observations colonies of *Candidula intersecta* (1) and *Cernuella virgata* (8) were still present in one of the other new quarters of this still expanding village in 1994. The presence of additional colonies in (private) gardens may be expected elsewhere.

### Literatuur

- Mienis, H.K., 1994. Enkele nieuwe vindplaatsen van Duinslakken in Heerhugowaard. *De Kreukel*, 30(5-6): 65-66.  
Mienis, H.K., 2000. Nieuwe vondsten van Gras- en Duinslakken in Groot Waterland. *De Kreukel*, 36(4): 51-54.

Adres van de auteur:

National Mollusc Collection; Berman Building  
Department of Evolution, Systematics & Ecology; Hebrew University  
91904 Jerusalem, Israël  
E-mail 1: mienis@hotmail.com; E-mail 2: mienis@netzer.org.il