

Nieuwe uitgaven van de Vogelwerkgroep

De medewerkers krijgen gratis een exemplaar. Publicaties zijn te lenen uit de verenigingsbibliotheek in de Infoschuur. Paul Keuning is daarvan de bibliothecaris. Sinds een jaar of vijf wordt van de rapporten een pdf gemaakt, die via de website te raadplegen zijn.

Dick Jonkers

Karakteristieke broedvogels verdwenen uit het Hilversums Wasmeer.

Het gebied dat in 2012 is geïnventariseerd besloeg niet alleen het ingerasterde gedeelte dat binnen het wasmeer ligt. Ook het door een hekwerk afgesloten deel daarbuiten langs de rijksweg A27 was daar bij inbegrepen, evenals parallel lopend een bosstrook aan de zuidzijde van het wasmeer. Totaal ging het om circa 45 ha, waarin 36 verschillende soorten tot broeden kwamen. Hiervan bevonden zich er 31 binnen het raster. Interessante broedvogels buiten het wasmeer waren ransuil, zwarte specht,

appelvink en sijs. In de periode 1970-2012 is het ingerasterde deel zeven keer volledig onderzocht. Wanneer 1970 wordt vergeleken met 2012 blijkt het aantal soorten gelijk te zijn, maar is de broedvogelsamenstelling sterk veranderd. Verdwenen zijn de karakteristieke soorten van heidevennen, zoals geoorde fuut en dodaars. Ook de bergeend liet het afweten, en de kokmeeuwen vestigden zich er in 1974 voor het laatst.

In hun plaats kwamen soorten zoals grauwe gans, brandgans en nijlgans.

Jonkers, D.A. & De Boer, J. 2013. Broedvogels van het Hilversums Wasmeer in 2012. *Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 208. 27 blz.*

Broedvogels van parken in Huizen

Casander, H., Jonkers, D. & Weenen, H. 2013. Vogels van parken Gooierhoofd, Bad Vilbel en Stadspark in Huizen in 2008.

Wie wat bewaart die heeft wat. Vijf jaar na de broedvogelinventarisatie is het rapport over het onderzoek in bovengenoemde parken dan toch verschenen. Het inventariseren van broedvogels in bebouwde kommen is in het algemeen geen populaire bezigheid. Om dat in parken te doen lijkt vogelaars wel aan te trekken als wordt afgegaan op de deelname van maar liefst vijftien leden in Huizen. Zij zagen kans om het broeden aan te tonen van 33 soorten in het Gooierhoofd, 35 soorten in het Stadspark en 28 soorten in het park Bad Vilbel. Een mooie score voor deze gebieden, waar m.u.v. het Gooierhoofd veel wordt gerecreëerd. Min of meer bijzondere, leuke soorten waarvan het voorkomen is vastgesteld, waren in het Gooierhoofd bergeend, dodaars,

waterral, rietzanger, bosrietzanger en nachtegaal.



Rietzanger

Foto: Roelof Molenaar

In park Bad Vilbel was dat de goudvink. Het Stadspark mocht er ook zijn met dodaars, ijsvogel, bosrietzanger, goudvink en appelvink. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor inrichting en beheer om de park nog aantrekkelijker te maken voor vogels.

Casander, H., Jonkers, D. & Weenen, H. 2013. Vogels van de parken Gooierhoofd, Bad Vilbel en Stadspark in Huizen in 2008. *Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 217. 57 blz.*

Vogels van het Kocherbos geïventariseerd.

Aanleiding om dit bos te inventariseren waren de plannen in Muiderberg om een tweede hockeyveld aan te leggen in of bij het Kocherbos. In het onderzoekgebied met een oppervlakte van 10 ha is het voorkomen vastgesteld van 30 verschillende soorten broedvogels. Samen bezetten zij 122 territoria, een hoge dichtheid aan broedvogels. Voor roofvogels was het een aantrekkelijk gebied, gezien het voorkomen van een paar buizerds

Stoekenbroek, F. 2013 Broedvogels van het Kocherbos te Muiderberg in 2013.
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 218. 7 blz.

Inventarisatie van het westelijk deel van de Breukeleveense Plas

Van deze plas is 49 ha onderzocht; het grote open water bleef buiten beschouwing. 55 soorten maakten als broedvogel gebruik van dit gebied. De tegenwoordig in Nederland vrijwel overal in moerassen broedende grauwe gans voerde de lijst aan. Heugelijk was ook de aanwezigheid van de tweede soort in de top drie, de purperreiger. Een goede derde was de tjiftjaf, wat indiceert dat er aan de rand van de plas verbossing is opgetreden. Dat is ook te zien als de inventarisatie van 1980 wordt vergeleken met die van 1980. Er zijn in de periode 1980-2013 vier inventarisaties gehouden en het is daardoor mogelijk trends

Prop.D. 2013. Broedvogels van de Breukeleveense Plas 2013.
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 220. 38 blz.

Broedvogels Corversbos 2013

Ook het Corversbos ging in de herhaling. De inventarisatiegroep kwam in dit gebied uit op 32 soorten, die samen 386 territoria bezetten. In de categorie 1-10 paren bevonden zich 18 soorten, waaronder grote lijster, kleine karekiet, fluiter, appelvink en goudvink. De categorie 11-20 paren bevatte vijf soorten, waaronder glanskop en kuifmees en ook maar liefst 15 paren goudhaantjes. Die van 20 tot 50

Mooij, J. 2013. Broedvogels van het Corversbos in 2013.
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 221. 38 blz.

Bonte vliegenvangers deden het goed in 2013

De auteur van het verslag merkt in zijn inleiding op dat het broedseizoen gekenschetst kan worden als zeer chaotisch door de

en eveneens een paar sperwers. Ook de bosuil en ransuil huisden er. De holenbroeders waren goed vertegenwoordigd en ook boom-, struik-, vegetatie- en bodembroeders hadden zich er gevestigd. Kortom een goed ecosysteem. Niet onvermeld mag blijven, dat er twee soorten aanwezig waren van de Rode Lijst: de ransuil en de groene specht.

Het is te hopen dat het plan om een deel van het bos te veranderen in een hockeyveld niet wordt uitgevoerd.

vast te stellen. Enkele voorbeelden volgen hier. Tot de verdwenen soorten behoren kokmeeuw, waarvan in 1980 nog een kolonie van 150-200 paren in het gebied huisde. In 1989 was er nog geen grauwe gans te bekennen; in 2002 waren er 157 territoria. In 2014 bleek dat er een daling was opgetreden naar 84 paren. De grote karekiet, een kensoort van gebieden met waterriet, verdween. Het fenomeen van de verbossing was niet alleen duidelijk merkbaar bij de tjiftjaf, die toenam van maximaal 15 paren in 1980 naar 38 paren in 2014. Ook van bijvoorbeeld de tuinfluiter en de winterkoning steeg het aantal broedparen aanzienlijk. Door de verbossing zakten de aantallen van de moeraszangers.

paren had de merel en de vink, met respectievelijk 46 en 42 paren als toppers. Opmerkelijk was het aantal van 23 paren van de grote bonte specht en dat van 24 paren voor de boomkruiper. De winterkoning scoorde in deze categorie ook goed met 33 paren. Opmerkelijk was de afname van de houtduif van 83 paren in 1988 naar 12 paren in 2013. Verder die van de roodborst in dezelfde jaren van 87 naar 36 paren.

aanhoudende kou. Daardoor was het extremer dan het seizoen 2012. Aan de andere kant constateert hij dat het uiteindelijk in de wat meer open terreinen toch wel weer meeviel, mogelijk door de grotere voedselbeschikbaarheid daar.

Vogels van het Kocherbos geïventariseerd.

Aanleiding om dit bos te inventariseren waren de plannen in Muiderberg om een tweede hockeyveld aan te leggen in of bij het Kocherbos. In het onderzoekgebied met een oppervlakte van 10 ha is het voorkomen vastgesteld van 30 verschillende soorten broedvogels. Samen bezetten zij 122 territoria, een hoge dichtheid aan broedvogels. Voor roofvogels was het een aantrekkelijk gebied, gezien het voorkomen van een paar buizerds

Stoekenbroek, F. 2013 Broedvogels van het Kocherbos te Muiderberg in 2013.
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 218. 7 blz.

Inventarisatie van het westelijk deel van de Breukeleveense Plas

Van deze plas is 49 ha onderzocht; het grote open water bleef buiten beschouwing. 55 soorten maakten als broedvogel gebruik van dit gebied. De tegenwoordig in Nederland vrijwel overal in moerassen broedende grauwe gans voerde de lijst aan. Heugelijk was ook de aanwezigheid van de tweede soort in de top drie, de purperreiger. Een goede derde was de tjiftjaf, wat indiceert dat er aan de rand van de plas verbossing is opgetreden. Dat is ook te zien als de inventarisatie van 1980 wordt vergeleken met die van 1980. Er zijn in de periode 1980-2013 vier inventarisaties gehouden en het is daardoor mogelijk trends

Prop.D. 2013. Broedvogels van de Breukeleveense Plas 2013.
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 220. 38 blz.

Broedvogels Corversbos 2013

Ook het Corversbos ging in de herhaling. De inventarisatiegroep kwam in dit gebied uit op 32 soorten, die samen 386 territoria bezetten. In de categorie 1-10 paren bevonden zich 18 soorten, waaronder grote lijster, kleine karekiet, fluiter, appelvink en goudvink. De categorie 11-20 paren bevatte vijf soorten, waaronder glanskop en kuifmees en ook maar liefst 15 paren goudhaantjes. Die van 20 tot 50

Mooij, J. 2013. Broedvogels van het Corversbos in 2013.
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Hilversum. Uitgave 221. 38 blz.

Bonte vliegenvangers deden het goed in 2013

De auteur van het verslag merkt in zijn inleiding op dat het broedseizoen gekenschetst kan worden als zeer chaotisch door de

en eveneens een paar sperwers. Ook de bosuil en ransuil huisden er. De hollenbroeders waren goed vertegenwoordigd en ook boom-, struik-, vegetatie- en bodembroeders hadden zich er gevestigd. Kortom een goed ecosysteem. Niet onvermeld mag blijven, dat er twee soorten aanwezig waren van de Rode Lijst: de ransuil en de groene specht.

Het is te hopen dat het plan om een deel van het bos te veranderen in een hockeyveld niet wordt uitgevoerd.

vast te stellen. Enkele voorbeelden volgen hier. Tot de verdwenen soorten behoren kokmeeuw, waarvan in 1980 nog een kolonie van 150-200 paren in het gebied huisde. In 1989 was er nog geen grauwe gans te bekennen; in 2002 waren er 157 territoria. In 2014 bleek dat er een daling was opgetreden naar 84 paren. De grote karekiet, een kensoort van gebieden met waterriet, verdween. Het fenomeen van de verbossing was niet alleen duidelijk merkbaar bij de tjiftjaf, die toenam van maximaal 15 paren in 1980 naar 38 paren in 2014. Ook van bijvoorbeeld de tuinfluiter en de winterkoning steeg het aantal broedparen aanzienlijk. Door de verbossing zakten de aantallen van de moeraszangers.

paren had de merel en de vink, met respectievelijk 46 en 42 paren als toppers. Opmerkelijk was het aantal van 23 paren van de grote bonte specht en dat van 24 paren voor de boomkruiper. De winterkoning scoorde in deze categorie ook goed met 33 paren. Opmerkelijk was de afname van de houtduif van 83 paren in 1988 naar 12 paren in 2013. Verder die van de roodborst in dezelfde jaren van 87 naar 36 paren.

aanhoudende kou. Daardoor was het extremer dan het seizoen 2012. Aan de andere kant constateert hij dat het uiteindelijk in de wat meer open terreinen toch wel weer meeviel, mogelijk door de grotere voedselbeschikbaarheid daar.