

beeld te voldoen. Aangezien deze eend wat verderop weer neerstreek was een tweede confrontatie mogelijk. Wat het eerst opviel nadat de eend wat beter te zien was, was dat hij kleiner was, en meer kastanjebruin van kleur. Bij goed kijken bleek er geen wit aan de snavelbasis te zijn, dit tesamen leek wel voldoende voor de determinatie als witoogend. De afstand tot de witoogend was ongeveer 25 meter. Opmerkelijk in het gedrag was het vrij lange duiken, soms bijna een halve minuut. Daarna ben ik nog enige malen gaan kijken om te zien hoe lang de eend verbleef en om het beest nog wat beter te leren kennen. Op 8 en 19 december bleek eveneens (vermoedelijk dezelfde) witoogend aanwezig, tevens probeerde ik nog eens te letten op twee andere kenmerken die wel te zien zouden moeten zijn, namelijk de hogere ligging in het water en de witte anaalstreek. De eerste keer had ik dit niet zo goed gezien. Aangezien op 8 en 19 december duidelijk een witte anaalstreek werd gezien, zal de witoogend wel een mannelijk ex. geweest zijn.

Overigens werd ook vorig jaar op Sassenheim-Zuid een witoogend waargenomen nl. op 24 oktober 1971.

Opsporing verzocht van zingende ruigpootuilen !

Eind september 1971 is een dode juveniele ruigpootuil gevonden in de Gasselten Staatsbossen (Dr.). De eerste waarneming voor Nederland !

Het broedgebied van de ruigpootuil strekt zich voornamelijk uit over Canada en vanuit Siberië westwaarts over Rusland, Scandinavië, Polen, Zwitserland tot in West-Duitsland (Lüneburger Heide, Harz, Westfalen, Schwabische Jura, Zwarte Woud) en Oost-Frankrijk. Als dwaalgast is hij enkele malen waargenomen in Engeland. Bovendien is hij in België in 1968 en '69 resp. 3 en 12 x broedend aangetroffen. De vraag is nu of we hier met een in Drente uitgebroede vogel te maken hebben of met één, die zich enkele honderden kilometers van zijn broedplaats heeft verwijderd. (Hij werd zeer vermagerd, maar zonder verwondingen aangetroffen, stijf, met nog heldere ogen. Hij was dus nog maar kort dood.) Aangezien de ruigpootuil (i.t.t. de steenuil) een praktisch strikt nachtelijke leefwijze heeft, zullen we levende exemplaren het best 's-nachts tijdens de zang van een ♂ op het spoor kunnen komen. Hij zingt vanuit een boomtop. Het geluid draagt in windstille nachten wel $\pm$ 2 km. ver en is onmiskenbaar en niet met het geluid van andere uilen te verwarren: "poe-poe-poe-poe-poe", een reeks van volle, weke, iets luider wordende toontjes in staccato gebracht, in strofen van $\pm$ 2 seconden. Dan is er $\pm$ 2 seconden rust, waarna de reeks van 3 à 12 toontjes zich herhaalt. Als hij goed op gang is, kan het mannetje zéér volhardend uren doorgaan. Met het zingen wordt al wat begonnen in november en het gaat door tot in juni. Hoofdroeptijd is midden maart tot midden mei.

Als biotoop heeft hij in het algemeen voorkeur voor grote rustige bossen, zowel van alleen naaldhout als ook gemengd met beuk en eik. Ook in berken en populieren is hij broedend aangetroffen, maar altijd voornamelijk in oude nestholten van zwarte spechten.

We moeten dus op vele plaatsen op de ruigpootuil bedacht zijn. Het zou bijzonder interessant zijn als we na de vondst in 1971 in de toekomst een levende ruigpootuil en zo mogelijk een broedgeval op het spoor zouden kunnen komen hier in het noorden !

Nu maar met de oren gespitst op "jacht" !

Bij vermoeden of zekerheid van de waarneming van een ruigpootuil graag contact opnemen met ondergetekende. Succes !

L.G. Groen

Bernhardlaan 2 , Bedum. Tel. 05900-2476.

Waarnemingen van de leden.

=====

Roodhalsfuut, *Podiceps griseigena*.

17-11-'72 Zuidlaardermeer bij de Leine 1 eks. waargenomen in gezelschap van 2 futen (P.J.v.Dorssen) ook 18-11-'72 1 eks. aanwezig.

Zwarte Zeeëend, *Melanitta nigra*.

19-11-'72 Sassenheim-Zuid of Zandmeertje, een visplas bij Haren. Vermoedelijk tengevolge van de zware storm op 13-11-'72 werden 15 eks waargenomen. Op 20-11 waren ze weer verdwenen (E.Boekema, J.Hulscher, P.J.van Dorssen)

Roodhalsgans, *Branta ruficollis*.

12-11-'72 Lauwersmeer 1 eks. tussen de brandganzen tijdens een waterwildtelling.

Slechtvalk, *Falco peregrinus*.

9-11-'72 Lauwersmeerpolder 1 eks. gezien (J.Hulscher e.a.)

Zecarend, *Haliaeetus albicilla*.

4-3-'72 Boven zeedijk Noordpolder (Baflo) verm.juv.eks zwevend naar oostel. richting. (G.Meeuwissen, H.Wijnand