

SNEEUWGORZEN EN STRANDLEEUWERIKKEN IN HET BINNENLAND

Jan Hulscher

Deze winter werden enkele waarnemingen gedaan van Sneeuwgorzen en Strandleeuwerikken in het binnenland van de provincie.

Sneeuwgorz

Op 15 en 18 januari 1979 fourageerden ongeveer 25 Sneeuwgorzen op bouw- en weiland bij de plas van Beerta (B. Voslamber).

Op 26 januari 1979 zagen Alco van Klinken en Michael Radt 2 ♂♂ en 1 ♀ op de dijk van de Hunze bij Noordlaren, fouragerend op verdroogde distels die boven de sneeuw uitstaken.

Op 9 februari 1979 zag Harm-Jan Wight 2 ♀♀ op de vloeivelden bij Hoogkerk. Jan Glas zag op 17 februari 1979 20 exemplaren bij Loeskwerd (Schildmeer) en op 25 februari 1979 1 ex. te Helling.

Op 17 maart 1979 werd 1 ex. in de Oostpolder (Haren) gezien door Egbert Boekema.

Verdere archiefwaarnemingen zijn:

- 4-11-1928 1 ex bij het Leekstermeer (Ardea 18: 37)
- 20-1 tot 2-2-1934 ongeveer 30 ex bij Groningen (Ardea 24: 67)
- 19 tot 23-9-1953 1 erg mak ex onder De Wilp (Vanellus 6: 171)
- 5-1-1963 1 ex op spuitveld Winschoterdiep (Egbert Boekema)
- 31-12-1967 1 ex op spuitveld Euvelgunne (Han de Boer)
- 19-1-1972 21 ex bij Wierumerschouw (Piet van Dorssen)
- 18-1-1973 20 ex bij kruising Reitdiep/van Starckenborghkanaal (H. Christerus)
- 22-11-1975 23 ex op akker bij station Warffum (Egbert Boekema)
- jan/feb 1976 3 à 5 ex zandlichaam Eemshavenweg bij Zuidwolde (Han de Boer)
- 5-11-1976 1 ♂ bij de Hoornse Plas (Egbert Boekema)
- 12-12-1976 1 ex Oostpolder (Haren) (Egbert Boekema)

Strandleeuwerik

Op 21 januari 1979 fourageerde volgens J. Bolt 1 ex op de weg bij Meerland (Winschoten).

Michael Radt zag op 27 januari 1979 om 4 uur 's middags 3 ♂♂ (op 20 m, goede belichting, 'hoorntjes' gezien) op een sneeuwvrij gemaakte voerplaats aan de Osdijk te Noordlaren.

Op 17 maart 1979 zag Egbert Boekema 1 ex in de Oostpolder (Haren), samen met o.a. de bovengenoemde Sneeuwgorz.

Er zijn slechts twee archiefwaarnemingen:

- 28-12-1923 5 ex onder Marum (Ardea 15: 62)
- 4-3-1967 5 ex bij Nieuwe Pekela (Ardea 42: 1-2)

Waarschijnlijk zijn de Sneeuwgorzen en Strandleeuwerikken naar het binnenland uitgeweken omdat ze door vorst en sneeuw aan de kust niets meer konden vinden. Maar ook onder normale omstandigheden komen beide soorten af en toe in het binnenland voor en waarschijnlijk veelvuldiger dan uit de geregistreeerde waarnemingen blijkt. De Frater is ook zo'n soort (zie het jubileumnummer van de Grauwe Gors, jaarg.6 nr. 1/2, 1978).

Let dus in de komende jaren eens goed op deze soorten en geef de waarnemingen door.