

Index De Takkeling, jaargang 24, 2016

- Abstracts roofvogelliteratuur, 93-96, 168-176, 258-260.
- Accipiter gentilis*, zie Havik.
- Accipiter nisus*, zie Sperwer.
- Afschot, 62-63, in NO-Turkije, 221-250.
- Asio flammeus*, zie Velduil.
- Asio otus*, zie Ransuil.
- Aquila clanga*, zie Bastaardarend.
- Bastaardarend, 75-79.
- Beheer, in duinen, versus roofvogels, 148-155.
- Bergen V.S. van, broedcyclus monogame en polygame Buizerds, 208-215.
- Berkvens, M., afwijkend verenkleed Havik, 111-118.
- Bijlsma, R.G., foeragegedrag Wespendif, 181-187; leercurve Slechtvalk en postduif, 143-147; literatuur, 93-96, 168-176, 258-260; overzicht broedende roofvogels Nederland, 5-60; postduiven als prooi van Haviken, 194-207; vervolging, 61-66; Wespendif, tam, 256.
- Blauwe Kiekendief, broedresultaten 2015, 22, 52-54; broedresultaten op Texel 2015, 162-163; trend Ameland 1955-2015, 19.
- Boommarter, op spreekwenslaapplaats, 102-110; predatie van Bosuilen, 148; predatie van roofvogels, 32-33, 156-161.
- Boomvalk, broedresultaten Nederland 2015, 38-40, 52-54; hoogspanningsmasten als broedplaats, 39, 257; kannibalisme, 216-220; nestplaats, 39-40; seksratio, 39; voedsel, 40; voorraadmast, 139-142.
- Bos, J., ringen op haviksnest, 121-123; ringen bij sperwernesten, 135-136; Sperwer als broedvogel in Groningen, 133-138.
- Bosmuis, trend, 7-9.
- Bosuul, leeftijd en turnover in de duinen, 148.
- Bruine Kiekendief, broedresultaten 2015, 18-22, 52-54; seksratio nestjongen, 21; trend Ameland, 19; vervolging, 56-58; vleugelmerken, 91; voedsel, 22, 55.
- Buizerd, als prooi Havik, 32; broedcyclus monogame en polygame paren, 208-215; broedresultaten 2015, 28-33, 52-54; broedsucces polygaam paar 2008-16, 215; camera-observaties, 208-215; nadelige effecten van terreinbeheer, 149-150; nestovername Nijlgans, 32; nestpredatie door Boommarter, 32-33, 156-161; oude knar, 165; seksratio, 31; vervolging, 61-66; vleugelmerken, 91; voedsel, 29, 32, 58-59, 155 (duinen), 208-215.
- Buteo buteo*, zie Buizerd.
- Camera, evaluatie, 215.
- Circus aeruginosus*, zie Bruine Kiekendief.
- Circus cyaneus*, zie Blauwe Kiekendief.
- Circus pygargus*, zie Grauwe Kiekendief.
- Columba livia*, zie Postduif.
- Dijk, J. van, Voorwoord, 3, 99, 179.
- Dolichovespula saxonica*, zie Saksische wesp.
- Duitse Wesp, 15-16.
- Falco peregrinus*, zie Slechtvalk.
- Falco subbuteo*, zie Boomvalk.
- Falco tinnunculus*, zie Torenavalk.
- Ganzeboom, P.D., voorraadmast Boomvalk, 139-142.
- Gedragscode, 166-167.
- Gewone Wesp, start in 2015, 11; timing, 12; trend, 12.
- Goote, H., lesgeven op scholen, 100-101.
- Grauwe Kiekendief, habitatgebruik, in Nederland, 22; in Oldambt, 73-74.
- Haliaeetus albicilla*, zie Zearend.
- Halma, J., Havik te water, 119-120.
- Havik, afwijkende slagpennen, 111-119; broedresultaten Nederland 2015, 23-26, 52-54; confrontatie met Velduil, 82-86; nestovername Nijlgans, 24; pigmentatie slagpennen, 111-119; postduiven als voedsel, 25, 194-207; predatie door Boommarter, 25, 156-161; predatie op spreekwenslaapplaats, 102-110; ringen op nest, 121-123, 194-207; ringvondst, 80-81; seksratio, 24; te water, 119-1200; vervolging, 61-66; voedsel, 25-26, 56-57, 121-124, 194-207.
- Hoorbaar, bezetting van nestkasten, 36.
- Izaaks A., kannibalisme Boomvalk, 216-220.
- Jong, A. de, kleptoparasitisme van Torenavalk bij Velduil, 87-90.
- Klauwier, Grauwe, in gebruik als lokvogel bij vangst Sperwers in NO-Turkije, 221-250.
- Klemmen, 63.
- Kleptoparasitisme, door Torenavalk bij Velduil, 87-90.
- Koetze, J., zie Izaaks A.
- Konijn, achtervoetjes (prooi Buizerd), 59;

- nadelige effecten van beheer, 150; trend, 9-10.
- Koning, F., roofvogels en beheer in de duinen, 148-155.
- Koning, H.-J., zie Koning, F.
- Kurdoglu O., zie Magnin G.
- Landelijke Roofvogeldag 2016, 4; 2017, 180.
- Magnin G., valkerij NO-Turkije, 221-250.
- Natuurbescherming, succes in Turkije, 221-250.
- Natuurtijdschriften, repository, 92.
- Meppel, roofvogeldag 2016, 27 februari, 4; roofvogeldag 2017, 18 februari, 180.
- Milvus milvus*, zie Rode Wouw.
- Natuurtijdschriften, 92.
- Natuurwet, 99.
- Ouweneel, G., Bastaardarend in Europa, 75-79; Zearend Hellegatsplaten, 188-193.
- Oryctolagus cuniculus*, zie Konijn.
- Pandion haliaetus*, zie Visarend.
- Pernis apivorus*, zie Wespendif.
- Postduif, leeftijd als havikprooien, 56; prooi Havik, 25; (geen) prooi Slechtvalk, 143-147; prooi van Haviken in 20ste eeuw, 194-207; trend Nederland, 194-207.
- Predatie, door Boommarter, 33, 156-161; op spreuwenlaapplaats, 102-110.
- Raamslachtoffers, als potentiële prooi van Sperwer, 128.
- Ransuil, als prooi van Havik, 25.
- Riem Vis R., zie Bergen van.
- Rode Wouw, broedgevallen Nederland, 16-17; vleugelmerken, 91.
- Rol. R. van der, acht jaar Sperwer in de tuin, 124-132.
- Roofvogeldag, 4, 180.
- Roofvogelzwendel, 165-166.
- Saksische wesp, verkeersdrukte, 182.
- Schreven K., predatie op spreuwenzwerm, 102-110.
- Slechtvalk, boombroeders, 145-146; in Nederland in 2015, 40-42, 52-54; misvangst postduif, 143-147; verstoring, 63; voedsel, 60.
- Sperwer, acht jaar in tuin, 124-132; broedgevallen in Groningen, 133-138; broedresultaten Nederland 2015, 26-28, 42-54; jachtwijze in tuin, 124-132; op spreuwenlaapplaats, 105; seksratio, 28; vangst en valkerij NO-Turkije, 221-250.
- Spieker, W., ringvondst Havik, 80-81.
- Steenhuis F., confrontatie Velduil-Havik, 82-86.
- Straalen D. van, Zearend Hellegatsplaten, 188-193.
- Strix aluco*, zie Bosuil.
- Suriname, roofvogels, 251-255.
- Terreinbeheer, effecten op roofvogels, 148-155.
- Torenvalk, broedresultaten 2015, 34-37, 52-54; nestkastovername door nijlganzen, 37; vervolging, 61-66; voedsel, 36.
- Tulden, P. van, vervolging in Nederland, 61-66.
- Valkerij, in NO-Turkije, 221-250.
- Veldmuis, aandeel in dieet Ransuil in 1968-2015, 8; index Vledder Aa, 7; instorting piek 2014, 7-8.
- Velduil, afschot, 64; beroofd door Torenvalk, 87-90; confrontatie met Havik, 82-86; op spreuwenlaapplaats, 105.
- Vergiftiging, 61-66, 163.
- Verstoring, door hoogzitten, 166-167.
- Vervolging, boskap, 148-155; hoogzitten, 166-167; in Nederland 2015, 61-66; zwendel, 165-166.
- Vespa crabro*, cf. Hoornaar.
- Vespula germanica*, cf. Duitse wesp.
- Vespula vulgaris*, cf. Gewone Wesp.
- Visarend, broedgeval in 2016, 163-164; in Nederland 2015, 34.
- Vlas, S. de, kiekendieven in Oldambt, 73-74.
- Vroege J.A., broedgevallen van Wespendif Castricum, 67-72; roofvogels versus Boommarters, 156-161; roofvogels in Suriname, 251-255.
- Vogeldichtheid, in 2004-15, 11.
- Wespen, trend in Breda, 13; trend in Nederland, 11-13, 185; verkeersdrukte Saksische wesp, 182.
- Wespendif, broedresultaten in Nederland, 14-16; broedgevallen bij Castricum, 67-72, 156-161; foeragegedrag adulte vrouw, 181-187; gevangenschap, 257; nestplaatskeuze, 15; voedsel, 15-16.
- Zearend, broedgevallen 2015, 17-18; hoogspanningsmasten als zitpost, 188-193; invloed op verspreiding prooidieren, 191; vergiftigd, 163; voedsel, 17.
- Zwarte Wouw, broedgevallen Nederland, 17.