

juvenielen over het hoofd gezien zullen worden, maar voor populaties van een langlevende, relatief traag groeiende en voortplantende soort zoals de hazelworm zijn uitgegroeide, reproductieve exemplaren van groter belang dan pasgeboren juvenielen.


Een tweede belangrijke observatie is dat van het ene jaar op het andere ongeveer tweemaal zoveel exemplaren onder tapijttegels aangetroffen kunnen worden. Dat betekent dat bij wegvangen de mogelijkheid bestaat dat slechts een klein deel van de populatie gevangen wordt, ook gezien het feit dat niet de gehele populatie gebruik zal maken van de kunstmatige schuilplaatsen. In het nu lopende onderzoek zal getracht worden te bepalen welke factoren verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse verschillen. Ten slotte kan worden opgemerkt dat de hier gepresenteerde resultaten het monitoringsprotocol van RAVON bevestigen ten aanzien van de periode met de hoogste trefkans voor hazelworm (juli tot en met september). Ze laten echter ook zien dat variatie in monitoringsperioden binnen en tussen jaren tot verschillende uitkomsten kunnen leiden.

Dankwoord

Graag wil ik Stichting Gooisch Natuurreservaat bedanken voor toestemming om het veldwerk op terrein van de stichting uit te voeren, en Sergé Bogaerts voor het leveren van commentaar op een eerdere versie van dit stukje.

Victor Loehr

Kwikstaartpad 1
3403 ZH IJsselstein
loehr@homopus.org



Figuur 1. Maandgemiddelde aantallen hazelwormen (A) of volwassen hazelwormen (B) geteld per wekelijkse ronde in 2011-2013. De foutbalken geven de standaarddeviaties weer.

Mis-amplex

Mis-amplexen tussen verschillende soorten komen geregeld voor bij amfibieën. Afgelopen jaar (24-4-2013) ontvingen we van Geerling Kruidhof (Staatsbosbeheer) deze foto van een bruine kikker op een knoflookpad!



(Foto: Geerling Kruidhof)