

## Opvallend buikpatroon

Op 30 juni tijdens een excursie in het natuurgebied Nieuw Wulven bij Houten vonden we een ringslang met een opvallend buikpatroon. De zwarte plekjes op de buik bevinden zich allemaal in het midden in een mooie, bijna perfecte streepvorm. De ringslang had ook een paar anomalieën (verkeerd gevormde buikschubben). Deze ontstaan hoogstwaarschijnlijk door temperatuurverschillen in de broeihoop.

**Els Tove**

Ringslangenwerkgroep Houten



**Ringslang met opvallend buikpatroon. (Foto: Els Tove)**

## Vroege juvenielen

### **Vroege juveniele levendbarende hagedissen op het zuidelijkste heitje van Nederland**

Tijdens vakanties ga ik meestal even kijken bij reptielenrijke plekjes, zo ook dit jaar vanaf de camping in Zuid-Limburg. Op 15 juli ben ik naar het Onderste- en Bovenste Bos gelopen om een piepklein stukje heide te bekijken. Ongeveer 6 jaar geleden was ik hier ook en Staatsbosbeheer heeft toentertijd een grote ingreep gepleegd door het productiebos op en rondom deze heide te rooien. De grond is omgezet zodat de oppervlakte heide makkelijker vergroot. De omgeving staat hier bekend als Eperheide.

5 jaar geleden zag ik al wat levendbarende hagedissen langs de randen en een paar in wat oude heidestruiken welke het moeilijk hadden. Velen liepen er met een verkorte staart rond. De predatiedruk was blijkbaar hoog en er was weinig bescherming: alleen wat varens en pollen pitrus langs een pad.

Nu 5 jaar later tijdens zwaar bewolkt weer, het miezerde af en toe, bezoek ik het terrein weer. Ik zie een grotere oppervlakte jonge heide die soms door schapen wordt begraaasd. De hagedissen zitten niet in het oude heidedeelte, maar langs dezelfde rand als enkele jaren eerder: ik trof hier 12 hagedissen



**Habitat levendbarende hagedis Onderste Bos Zuid-Limburg. (Foto: Gré ter Woord)**



**Levendbarende hagedis met een verkorte staart. (Foto: Gré ter Woord)**