

Index De Takkeling, jaargang 25, 2017

- Abstracts roofvogelliteratuur, 93-96, 192.
- Accipiter gentilis*, zie Havik.
- Accipiter nisus*, zie Sperwer.
- Afschot, 63-64.
- Beheer, in duinen, versus roofvogels, 176-187.
- Bergen V.S. van, doorbroeden Buizerd, 155-160.
- Bijlsma, R.G., In Memoriam Frank E. de Roder, 102-110; naschrift bij G. Jager, 151-154; literatuur, 93-96, 192; overzicht broedende roofvogels Nederland, 8-60; vervolging, 61-66.
- Blauwe Kiekendief, broedresultaten 2016, 25-26; gedrag op slaappleaats, 67-70; sjirpen, 67-70.
- Boommarter, als predator van roofvogels, 177-186.
- Boomvalk, broedresultaten Nederland 2016, 39-41; hoogspanningsmasten als broedplaats, 41; kunstnesten, 161-164; nestplaats, 41; seksratio, 40; voedsel, 41.
- Bos, J., ringen bij sperwernesten, 77; Sperwer als broedvogel in Groningen, 73-78.
- Bosmuis, trend, 12-13; voedsel, 12-13.
- Bruine Kiekendief, broedresultaten 2016, 23-25, 53-54; seksratio nestjongen, 24; vervolging, 64; vissend, 191; voedsel, 24-25, 55; wingtag, 116-118.
- Buizerd, aanvallend, 111-115; beheer duinen, 176-187; broedgevallen Castricum 2000-15, 181-183; broedresultaten Nederland 2016, 33-35, 53-54; broedverdeling man/vrouw, 155-160; camera-observaties, 155-160; doorbroeden op onbevruichte eieren, 155-160; nestovername Nijlgans, 34; oude knar, 191; predatie door Boommarter, 180; seksratio, 35; vervolging, 61-66; voedsel, 35, 58-59; voedsel naar regio, 43; witte, 81.
- Buteo buteo*, zie Buizerd.
- Camera, observatie buizerdnest, 155-160; op stok, 188-190.
- Circus aeruginosus*, zie Bruine Kiekendief.
- Circus cyaneus*, zie Blauwe Kiekendief.
- Circus macrourus*, zie Steppiekiekendief.
- Circus pygargus*, zie Grauwe Kiekendief.
- Columba livia*, zie Postduif.
- Curculio glandium*, zie Eikelboorder.
- Dekker, D., jachtgedrag Slechtvalken Nederland en Canada, 165-175.
- De Takkeling, begintijd, 3-6.
- Dijk, J. van, 99.
- Dolichovespula saxonica*, zie Saksische wesp.
- Eikelboorder, 13.
- Es, T. van der, broedgeval Visarend Biesbosch, 85-91.
- Falco peregrinus*, zie Slechtvalk.
- Falco subbuteo*, zie Boomvalk.
- Falco tinnunculus*, zie Torenvalk.
- Gewone Wesp, trend, 18.
- Grauwe Kiekendief, in Nederland, 26.
- Haliaeetus albicilla*, zie. Zearend.
- Haas, trend, 14-15.
- Havik, broedresultaten Nederland 2016, 27-30, 53-54; nestovername Nijlgans, 30; postduiven als voedsel, 30, 119-150, 151-154; predatie door Boommarter, 178; seksratio, 29; vervolging, 64; vissend, 71-72; voedsel, 30, 56-57, 119-150 (Veluwe en Drenthe, 1955-1956), 151-154; voedselverbruik, 136-139, 145-146.
- Huijzers G., vleugelmerk Bruine Kiekendief, 116-118.
- Izaaks A., kunstnesten Boomvalk, 161-164.
- Klemmen, 64.
- Koetze, J., zie Izaaks A.
- Konijn, achtervoetjes (prooi Buizerd), 59; trend, 14-15.
- Laak P. van de, vissende Havik.
- Lepus europaeus*, zie Haas.
- Martes martes*, zie Boommarter.
- Meppel, roofvogeldag 2017, 18 februari, 7.
- Methoden, aantalsbepaling van prooi-soorten bij Havik, 149-150; prooikeus Havik, 140-142.
- Milvus milvus*, zie Rode Wouw.
- Moorlag, H., witte Buizerd, 81.
- Neut, J. van der, zie Es, T. van der.
- Ouweneel, G., Sperwer in tuin, 100-101.
- Oryctolagus cuniculus*, zie Konijn.
- Pandion haliaetus*, zie Visarend.
- Pernis apivorus*, zie Wespndief.
- Ploeg J. van der, zie Ploeg R. van der.
- Ploeg R. van der, camera op stok, 188-190.
- Postduif, als havikprooi, 30, 56; 119-150, 151-154.
- Pot, A., waarneming Visarend, 82-84.
- Predatie, door Boommarter, 33, 156-161; op spreuwen slaappleaats, 102-110.

- Quist, M., herinneringen, 3-6.
 Riem Vis R., zie Bergen van.
 Rode Wouw, broedgevallen Nederland, 20-21.
 Roder F.E. de, In Memoriam, 102-110.
 Saksische wesp, verwarmen broed, 17.
 Slechtvalk, in Nederland in 2016, 41-42, 53-54; jachtgedrag in Nederland en Canada, 165-175; voedsel, 42, 60.
 Sperwer, agressief gedrag bij nest, 75; broedgevallen Castricum 2000-15, 179-180; broedgevallen in Groningen in 2016, 73-78; broedleeftijd vrouwen, 76; broedresultaten Nederland 2016, 30-33, in tuin, 100-101; luisvliegen, 76; seksratio, 33; start eileg 1984-2016, 31; terugmelding, 79-80; trend in Nederland, 45; verstoring, 33, 64; voedsel, 77.
 Steppekiekendief, broedgeval Nederland, 99.
 Terreinbeheer, effecten op roofvogels, 176-187.
 Torenvalk, broedresultaten 2016, 37-39, 53-54; effect muizenstand, 37; nestkastovernamen door nijlganzen, 39; vervolging, 64; voedsel, 38-39.
 Tulden, P. van, vervolging in Nederland, 61-66.
 Veldmuis, aandeel in dieet Ransuil op Veluwe 1968-2016, 11; in Drenthe in 1984-2016, 12; in Friesland 2008-15, 12; index Vledder Aa, 11.
 Vergiftiging, 61-66, 163.
 Vervolging, boskap, 176-187; in Nederland 2016, 61-66, 99.
Vespula vulgaris, cf. Gewone Wesp.
 Visarend, broedgeval in 2016, 36; broedgeval Biesbosch, 85-91; waarneming, 82-84.
 Vogels, aanbod in zomer, 15-16.
 Vroege J.A., aanvallende roofvogels, 111-115; beheer versus roofvogels, 176-187; roofvogels Castricum 2000-15, 176-187.
 Wespen, trend in Breda, 18; trend in Nederland, 17-18.
 Wespendif, broedgevallen Castricum, 2000-15, 180-181; broedresultaten in Nederland, 19-21; nestplaatskeuze, 20; voedsel, 20.
 Winter, A.-E. de, terugmelding Sperwer, 79-80.
 Woets, D., sjiropende kiekendieven, 67-70.
 Zearend, broedgevallen 2016, 22; vergiftigd, 64; voedsel, 22; Zuidlaardermeer, 92.
 Zwarte Wouw, broedgevallen Nederland, 21.