

voorkomen. Dit zijn soorten, die op de rode lijst staan (sterk bedreigd) of als een belangrijke indicator bekend staan om de kwaliteit, voor- of achteruitgang e.d. goed te kunnen beoordelen. Enkele aandachtsoorten, die wij inderdaad hebben kunnen vinden zijn de Kostgangersboleet, de Cantarel, de Bruine Anijszwam en de Zwavelgele melkzwam. Bovendien waren al eerder in dit gebied aandachtsoorten gevonden zoals de Oorlepelzwam, de Narcisamaniet en de Teervlekkenzwam.

Ondanks het feit, dat het seizoen dit jaar wat minder was dan in voorgaande jaren zijn er toch nog heel wat leuke waarnemingen gedaan. Opvallend was het grote aantal Porseleinzwammem, die hier en daar massaal op dode beuketakken voorkwamen. Een opvallende vondst in de Coepelduinen was een groot aantal Koeieboleten nabij een klein groepje dennen.

Daar zou je deze fraaie boleten zeker niet verwachten. In dezelfde Coepelduinen vielen ook weer de mooie Wasplaten te bewonderen, zoals de Zwartwordende en de Puntmuts. Wasplaten vallen op door hun glimmende felle kleuren en vormen zeker een sieraad in het duingebied. Met de Aardsterren was het in dit gebied wat minder goed gesteld, maar op enkele plekken konden toch mooie voorbeelden van de Gewimperde en de Kleine aardster worden gevonden.

Kortom, toch geen onaardig seizoen, terwijl er ook nieuwe plannen zijn gemaakt voor het komend jaar, zoals het monitoringsproject.

In ieder gavel komt er nog een zogenaamde terugkomavond, waarop ieders ervaring kan worden uitgewisseld en waarop ook een ieder zijn mooiste waarnemingen kan tonen.

EEN MERKWAARDIGE VONDST

Het gebeurt vrij vaak dat planten na een hete droge zomer een tweede bloei beleven vooral als de septembermaand mooi weer geeft en van tijd tot tijd wat regen. De zomer van 1999 was zo'n zomer met een paar hittegolfjes die er voor zorgden dat het duin flink uitdroogde.

Dat een meidoorn in september weer ging bloeien was een complete verrassing voor me. Dat opnieuw in bloei komen kende ik eigenlijk maar van een struik namelijk de Kardinaalsmuts. Als deze struik in het vroege voorjaar helemaal ingekapseld zit met het spinsel van de rupsjes van de kardinaalsmutsmot, verschrompelen alle blaadjes en geef je geen stuiver meer voor het leven van zo'n struik. Als de motjes zijn uitgevlogen en het spinsel is verdwenen, loopt de Kardinaalsmuts weer

gewoon uit en gaat ook bloeien, weliswaar wat later dan de niet-aangetaste struiken.

De bloeiende meidoorn stond langs het rijwielpad in de Noordduinen dat afbuigt naar het strand. Van een groepje, lage, wat armetierige meidoorns stond er één voor ongeveer een kwart in bloei. Het is een bijzonder vreemd gezicht om half september aan een tak met bloesem ook de vruchten van dat jaar te vinden.

Mijn vraag is: heeft u dit jaar ook voor de tweede keer bloeiende meidoorns of andere struiken aangetroffen?

Ees Aartse
Tel. 071-3614268

