

Broedvogelinventarisatie in de AWD in 1999

1 Gijs Kokkieshoek

geïnvventariseerd door E. Aartse

Terreinomschrijving:

Het geïnvventariseerde gebied wordt in het noorden begrensd door de Halfwegseslag, in het oosten door het rijwielpad, in het zuiden door de Langevelderslag en in het westen door de Houtweg.

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 47 ha.

Waarvan:

circa 7 ha. Duinberkenbos

circa 15 ha. duindoorn/vlierstruweel

circa 5 ha. stuifzand en stuifplekken

circa 20 ha. open duin met Duinriet, Zandzegge en Helm.

Volgens het beheersplan wordt een beperkte verstuiwing toegelaten.

Het terrein is erg geaccidenteerd. Vanaf de Langeveldeberg (27 m + NAP) loopt het terrein glooiend af naar de Langevelderslag en de Halfwegseslag. Paden komen in het terrein niet meer voor. De oude voerbanen zijn thans geheel dichtgegroeid. De Rozendel is nauwelijks meer begaanbaar.

Broedvogels van Gijs Kokkieshoek:

1995 t/m 1998

Soort	95	96	97	98	99
Fazant	-	1	1	-	-
Houtduif	6	10	8	3	1
Zomertortel	2	3	3	2	2
Koekoek	1	1	1	1	1
Boomleeuwerik	-	1	1	3	5
Boompieper	-	-	1	2	1
Graspieper	2	2	3	5	6
Winterkoning	3	2	3	1	4
Heggemus	17	24	23	22	16
Roodborst	1	-	2	1	3
Nachtegaal	18	21	24	22	20
Gekr. Roodstaart	2	2	2	2	2
Roodborsttapuit	3	3	2	5	5
Tapuit	3	3	1	1	-
Merel	5	6	1	5	8
Zanglijster	-	2	-	1	1
Sprinkhaanzanger	1	3	1	1	2

Soort	95	96	97	98	99
Braamsluiper	4	5	4	4	3
Grasmus	15	22	25	23	17
Zwartkop	2	1	1	2	2
Tjiftjaf	2	3	2	3	3
Fitis	21	22	22	25	20
Staartmees	-	1	-	-	-
Glanskop	-	-	1	-	-
Pimpelmees	-	1	2	1	1
Koolmees	4	5	4	3	3
Vlaamse Gaai	2	2	1	2	2
Ekster	5	5	5	4	5
Kneu	4	6	7	6	6
Goudvink	-	1	-	1	-
Zwarte Kraai	-	-	-	-	1
Totaal aantal soorten	22	26	27	27	26
Aantal broedgevallen	123	157	155	152	140

Toelichting 1999

De Houtduif is bijna verdwenen. We moeten er rekening mee houden dat de toename van de Havik in de AWD nu ook van invloed is op het aantal broedparen van de Houtduif in het zuidelijk duingebied. De Boomleeuwerik vertoont een spectaculaire toename, niet alleen in Gijs Kokkieshoek, maar in het hele zuidelijk duingebied en De Blink. Op 18 en 26 maart waren vanaf de Langeveldeberg vijf zingende mannetjes tegelijkertijd boven Gijs Kokkieshoek te horen, doch ook veel zingende mannetjes uit aangrenzende gebieden. Van een broedpaar per ongeluk het nest gevonden, twee andere broedparen zien vliegen met voer.

De Tapuit is (voorlopig?) als broedvogel verdwenen in Gijs Kokkieshoek. Alleen in de trektijd enkele exemplaren waargenomen, maar binnen de datumgrenzen werd geen enkele Tapuit meer in het terrein gezien: geen balts, geen gezang. Niets!!

Het liet zich aanzien dat ook de Ekster door predatie van de Havik achteruit zou gaan. Dit bleek niet het geval. Wel bestaat de indruk dat de Eksters wat schuwer zijn geworden.

De Zwarte Kraai is een nieuwe broedvogel in het terrein. Broedde in een vlier in de Schapendel. Vanaf het duin keek je zo in het nest.

Doortrekkers:

De volgende soorten verbleven enige tijd in Gijs Kokkieshoek, maar bleken toch doortrekkers te zijn: Paartje Wulp met zingend mannetje boven Langeveldeberg. Heeft daar in 1993 voor het laatst gebroed.

Ringmus in Speerstekeldelletje. Heeft daar in de jaren tachtig gebroed. Bosrietzanger in Natte Bos. Heeft daar in 1994 gebroed.

2 Boeveld-West

geïnvventariseerd door W. Baalbergen en J. Veeffkind

Terreinomschrijving:

Het geïnvventariseerde gebied wordt in het Noorden begrensd door het Finnlayweggetje, in het oosten door de Houtweg en een stukje onverhard wandelpad, in het zuiden door het raster langs de Langevelderslag en in het westen door het voormalige Van Limburg Stirumkanaal.

Het onderzochte gebied kan men grofweg in twee delen verdelen. Het zuidelijke deel wordt grotendeels bepaald door een vrij kaal duinenplateau met toppen van 18 m. Het noordelijke deel is begroeid met struweel. De oppervlakte bedraagt circa 28 ha.

De recreatiedruk is er, mede als gevolg van de dichtbij gelegen ingang, erg groot.

Broedvogels van Boeveld-West:

Soort	95	96	97	98	99
Wilde Eend	-	-	-	-	-
Fazant	-	1	1	2	1
Bontbekplevier	-	-	-	-	1
Houtduif	2	2	2	2	1
Zomertortel	-	1	-	1	1
Koekoek	1	1	1	-	1
Boomleeuwerik	-	-	-	1	1
Boompieper	1	1	1	-	1
Graspieper	2	4	1	2	3
Winterkoning	2	-	2	-	3
Heggemus	10	12	10	7	8
Roodborst	-	-	-	-	-
Nachtegaal	9	5	6	7	8
Gekraagde Roodstaart	-	1	1	-	1
Roodborsttapuit	2	4	2	3	2
Tapuit	-	1	1	-	-

Soort	95	96	97	98	99
Merel	2	1	2	2	3
Sprinkhaanzanger	1	-	1	2	2
Braamsluiper	1	2	2	2	2
Grasmus	10	14	9	9	15
Tjiftjaf	1	-	3	2	2
Fitis	12	9	7	10	9
Pimpelmees	1	1	1	-	-
Koolmees	-	1	1	3	2
Vlaamse Gaai	1	1	1	2	-
Ekster	4	2	2	1	2
Zwarte Kraai	1	2	-	1	1
Kneu	6	7	4	7	5
Putter	-	-	-	-	1
Goudvink	1	1	-	-	1
Rietgors	1	-	-	-	1
Totaal aantal soorten	21	22	22	19	26
Aantal broedgevallen	71	74	61	66	78

Toelichting 1999:

Het zand van het voormalige Van Limburg Stirumkanaal wordt nog steeds verder naar het zuid-oosten geblazen en overdekt de daar aanwezige begroeiing. In dit deel steekt, speciaal op de vochtige stukken, wat begroeiing de kop op. Na het dichten van het kanaal en de overstuiving van een strook ten oosten hiervan is de vogelstand gedecimeerd. Het laat zich aanzien deze zich langzamerhand weer wat herstelt. Zo is de Goudvink dit jaar weer als broedvogel teruggekeerd. In het tracé van het voormalige kanaal heeft een Bontbekplevier gebroed. Het nestje lag in de nabijheid van een natte plek en bevatte vier eieren. Het is niet bekend of de jongen goed zijn uitgelopen.

3 Wolfsveld-West

geïnvventariseerd door B. Heethuis en J. Jacobs

Terreinomschrijving:

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Ruigenhoeke Schulpweg, in het oosten door het

Finnlayweggetje en in het verlengde daarvan door een denkbeeldige lijn over de Kop van het Ronde Vlak en de oostkant van het Spejende. In het zuiden is het terrein begrensd door het Finnlayweggetje en in het westen door de stuivende zandvlakte van het voormalige Van Limburg Stirumkanaal.

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 35 ha. Hierin liggen vijf dellen n.l. Lange Vlak, Spejendel, Abelendel, Biezenvlakje en Ronde Vlak. Deze dellen bestaan grotendeels uit Meidoorn, Liguster, Berk, Populier, Kardinaalsmuts, Vlier en Duindoorn.

Broedvogels Wolfsveld-West: 1995 t/m 1999

Soort	95	96	97	98	99
Buizerd	-	-	1	-	-
Fazant	2	2	2	1	1
Houtduif	3	4	4	2	3
Koekoek	1	1	1	1	1
Zomertortel	2	1	2	1	1
Boomleeuwerik	-	-	-	-	1
Boompieper	-	-	1	-	1
Graspieper	1	1	1	2	3
Winterkoning	8	3	4	1	5
Heggenmus	13	13	14	12	18
Nachtegaal	11	13	11	14	13
Roodborsttapuit	4	4	4	5	5
Merel	6	3	3	2	3
Zanglijster	2	-	1	-	-
Sprinkh. zanger	1	4	2	3	2
Braamsluiper	3	3	3	1	3
Grasmus	14	19	13	17	18
Tijftjaf	1	2	3	4	3
Fitis	17	20	14	14	17
Pimpelmees	2	2	6	3	3
Koolmees	7	4	5	4	7
Vlaamse Gaai	1	2	1	1	1

Soort	95	96	97	98	99
Ekster	4	5	4	3	2
Zwarte Kraai	1	2	2	-	1
Kneu	2	3	4	4	7
Goudvink	-	1	-	-	-
Rietgors	1	-	-	-	1
Totaal aantal soorten	23	22	24	21	24
Aantal broedgevallen	107	112	106	98	120

Toelichting 1999

Het westelijke gedeelte van het terrein wordt steeds meer overstoven door zand uit het voormalige kanaal, waardoor het potentiële broedgebied voor veel vogels kleiner wordt. Door de vernatting vanwege de stijgende grondwaterstand en de langzaam opkomende begroeiing in het tracé van het voormalige kanaal zal daar hopelijk spoedig een einde aan komen. Deze nieuwe begroeiing zal echter ook weer nieuwe kansen scheppen voor andere vogelsoorten. We hebben dit jaar een toename van 23 broedsels t.o.v. vorig jaar, dat overigens met 98 broedsels een dieptepunt was. Deze winst kwam voornamelijk voor rekening van algemeen voorkomende soorten, zoals de Heggenmus (+6), Fitis (+3), Koolmees (+3) en Kneu (+3). Maar ook telden we drie nieuwe soorten met elk één broedsel n.l. Boomleeuwerik, Tuinfluiter en Rietgors. En de Zwarte Kraai was weer terug, na één jaar overgeslagen te hebben als broedvogel in dit gebied. We hadden dit jaar geen soorten, die sterk achteruit zijn gegaan of zijn verdwenen. Voor volgend jaar hopen we ook in ons gedeelte van het voormalige Van Limburg Stirumkanaal nieuwe soorten aan te treffen, zoals dit jaar is gebeurd ten noorden van ons gebied met de Kleine Plevier en de Kievit, en ten zuiden van ons gebied met de Bontbekplevier. Deze feiten, en ook dat de Rietgors in ons gebied na 4 jaar weer terug is, geven in ieder geval weer hoop voor de toekomst.

4 Westhoek/Haasvelderbeken

geïnventreerd door J. van Saase en W. van Leeuwen

Terreinomschrijving:

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Nieuwe Haasvelderweg of Heiweg, in het oosten door de slag van de Westhoek, in het zuiden door de


Starrenbroekerweg en in het westen door de Haasvelder Klugtweg.

Het terrein is niet sterk geaccidenteerd. De Trapjesberg is met ruim 16 meter + NAP de hoogste duintop. In de omgeving van het Haasveld (oorspronkelijk Haags-Veld) zijn nog vele sporen aanwezig van een vroegere landbouwvestiging, zoals oude teelthoecken (=duinkrochten) en weites, droge wateringen, greppels en oude beekbeddingen. De vlakke gedeelten zoals de "Lange Velletjes" en "Het Weite van de Wilgenpoort" zijn sterk verruigt.

Broedvogels van Westhoek/Haasvelderbeken: 1995 t/m 1999

Soort	95	96	97	98	99
Fazant	24	15	9	10	6
Houtduif	4	6	3	-	-
Zomertortel	1	-	-	-	-
Koekoek	4	3	3	3	2
Groene Specht	1	-	-	-	1
Boompieper	9	8	5	9	10
Graspiëper	1	1	1	-	7
Winterkoning	14	-	2	4	5
Heggenmus	9	9	6	5	3
Roodborst	1	1	1	-	3
Nachtegaal	11	15	11	9	16
Gekr. Roodstaart	1	3	3	3	2
Roodborsttapuit	3	5	3	5	3
Merel	4	6	2	5	3
Zanglijster	-	-	-	-	1
Sprinkhaanzanger	10	10	8	9	9
Braamsluiper	4	4	1	2	3
Grasmus	21	24	16	21	24
Tuinfluit	1	-	-	-	2
Tijftjaf	5	4	5	9	21
Fitis	59	58	49	44	53

Soort	95	96	97	98	99
Glanskop	1	-	-	-	-
Pimpelmees	3	2	3	-	2
Koolmees	9	14	7	8	9
Vlaamse Gaai	1	2	1	-	-
Ekster	7	4	-	-	-
Zwarte Kraai	1	-	1	-	-
Vink	-	-	2	1	1
Kneu	7	8	6	4	2
Totaal aantal soorten	27	21	23	19	23
Aantal broedgevallen	216	202	148	153	188



Boompieper

5 Hoegatterduin

geïnterviewd door S. Vos


Terreinomschrijving:

Het onderzochte gebied is c. 50 ha groot. In het noorden en oosten wordt het terrein begrensd door de Hoegatterweg, in het zuiden door de Zilkerslag (Joppeweg) en in het westen door het Oosterkanaal. Door het gebied lopen enkele zandpaden. Het gebied kenmerkt zich door een rug van vrij kale duinen met veel stuifgaten. We vinden verspreid over het terrein enkele bosjes van voornamelijk eikehakhout zoals b.v. het Amerikaanse Bosje. Langs het Oosterkanaal vinden we enkele bosjes van de Oostenrijkse den.

Broedvogels van Hoekgatterduin: 1995 t/m 1999

Soort	95	96	97	98	99
Knobbelzwaan	-	-	-	1	-
Nijlgans	1	1	1	1	1
Bergeend	1	-	1	-	-
Wilde Eend	1	1	4	3	2
Kuifeend	-	-	1	2	3
Boomvalk	1	1	-	1	1
Fazant	1	1	1	1	1
Meerkoet	-	-	1	2	2
Houtduif	6	5	4	6	5
Zomertortel	-	-	-	1	-
Koekoek	1	1	1	1	1
Groene Specht	2	2	1	-	2
Gr. Bonte Specht	1	1	1	2	1
Boomleeuwerik	-	-	-	-	1
Boompieper	7	6	6	8	7
Winterkoning	13	2	5	3	4
Heggemus	12	4	9	8	6
Roodborst	6	1	2	2	3
Nachtegaal	15	17	14	17	15
Gekr. Roodstaart	7	6	8	10	9
Paapje	-	1	-	-	-
Roodborsttapuit	-	1	1	1	2
Merel	4	3	6	7	5
Zanglijster	2	2	1	2	1
Sprinkhaanzanger	1	1	3	3	3
Braamsluiper	-	-	1	-	-
Grasmus	11	11	16	17	15
Tuinfluit	1	1	-	1	1
Zwartkop	-	1	2	1	1
Tijftjaf	4	3	4	8	8

Fitis	32	27	28	36	32
Staartmees	2	-	-	-	-
Glanskop	1	1	-	-	-
Kuifmees	-	-	-	-	-
Pimpelmees	10	6	8	11	12
Koolmees	12	9	14	15	16
Wielewaal	-	-	-	1	1
Vlaamse Gaai	5	5	2	1	3
Spreeuw	-	-	2	1	1
Ekster	5	5	3	3	3
Kauw	-	-	1	1	-
Zwarte Kraai	3	3	2	2	2
Ringmus	1	-	-	-	-
Vink	2	2	3	3	3
Kneu	2	2	2	2	2
Goudvink	1	-	-	-	-
Totaal aantal soorten	33	32	34	37	36
Aantal broedgevallen	174	131	159	187	176



Vastgesteld aantal broedgevallen: Kavels 1 t/m 5

Soort	95	96	97	98	99
Knobbelzwaan	-	-	-	1	1
Nijlgans	1	1	1	1	1
Bergeend	1	-	1	-	-
Wilde Eend	1	1	4	3	2
Kuifeend	-	-	1	2	3
Buizerd	-	-	1	-	-
Boomvalk	1	1	-	1	1
Fazant	27	20	14	14	9
Bontbekplevier	-	-	-	-	1
Meerkoet	-	-	1	-	2
Houtduif	21	27	21	13	10
Zomertortel	5	5	5	5	4
Koekoek	8	7	7	6	6
Groene Specht	3	2	1	-	3
Gr. Bonte Specht	1	1	1	2	1
Boomleeuwerik	-	1	1	5	8
Boompieper	17	15	14	20	20
Graspieper	6	8	6	9	19
Winterkoning	40	7	16	12	21
Heggemus	61	62	62	54	51
Roodborst	8	2	5	3	9
Nachtegaal	64	71	66	69	72
Zwarte Roodstaart	-	-	12	19	-
Gekr. Roodstaart	10	12	14	15	14
Paapje	-	1	-	-	-
Roodborsttapuit	12	17	12	19	17
Tapuit	3	4	2	1	-
Merel	21	19	14	17	22
Zanglijster	4	4	2	2	3

Sprinkh.zanger	14	18	15	18	18
Braamsluiper	12	14	11	9	11
Grasmus	71	90	79	87	89
Tuinfluiter	2	1	-	2	3
Zwartkop	2	2	3	3	3
Tjiftjaf	13	12	17	27	37
Fitis	141	136	120	129	131
Wielewaal	-	-	-	-	1
Staartmees	2	-	-	-	-
Glanskop	2	1	1	-	1
Pimpelmees	16	12	17	15	18
Koolmees	32	33	31	33	37
Vlaamse Gaai	10	12	6	7	6
Ekster	25	21	14	11	12
spreeuw	-	-	-	-	1
kauw	-	-	1	1	-
Zwarte Kraai	6	7	5	3	5
Ringmus	1	-	-	-	-
Vink	2	2	5	5	4
Kneu	21	26	23	23	22
vink	2	2	5	5	-
Goudvink	2	3	-	-	1
Rietgors	2	-	-	-	2
Totaal aantal soorten	40	36	40	40	43
Aantal broedgevallen	691	675	622	601	702

Graspieper

Anthus pratensis 14,5 cm

