

De Zeevlam	Noordwijk	16 kinderen	groep 3/4
Beekbrug	Lisse	61 kinderen	groep 6/7/8
De Zeevlam	Noordwijk	27 kinderen	groep 5/6
Schapedel	Noordwijk	25 kinderen	groep 5
Witte School	Noordwijk	25 kinderen	groep 6
Overplaats	Sassenheim	24 kinderen	groep 5
Andreasschool	Aerdenhout	27 kinderen	groep 8
Ireneschool	Noordwijkerhout	53 kinderen	groep 7/8
De Regenboog	Noordwijkerhout	125 kinderen	groep 1/2
Springplank	Sassenheim	29 kinderen	groep 6
Verjaardag	Noordwijk	6 kinderen	
Groene Delta	Oegstgeest	48 kinderen	brugklas
Springplank	Oegstgeest	32 kinderen	groep 7
Verjaardag	Noordwijk	9 kinderen	
Victorschool	Noordwijkerhout	40 kinderen	groep 7
De Eekhoorn	Leiden	31 kinderen	
Verjaardag	Voorhout	11 kinderen	
Totaal 45 groepen	141 begeleiders	1142 kinderen	10 volwassenen

De Jutter uit Noordwijk: 5 excursies naar het Leeuwenhorstbos met als thema Herfst.
In totaal 99 kleuters.

Broedvogelinventarisatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 2000

In 2000 zijn de broedvogelinventarisaties in het zuidelijk deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen voortgezet. Evenals de jaren 1997 t/m 1999 zijn de 5 kerngebieden geïnventariseerd volgens de BMP-methode van SOVON.

De 5 geïnventariseerde kerngebieden

1. Gijs Kokkieshoek, 47 ha
2. Boeveld-West, 28 ha
3. Wolfsveld-West, 35 ha
4. Westhoek/Haasvelderbeken, 55 ha
5. Hoegatterduin, 50 ha

Medewerkers

E. Aartse, W. Baalbergen, A. Gort, B. Heethuis,
J. Jacobs, W. van Leeuwen, J. Veefkind en S. Vos.

Verslag R. Stuyts

1 Gijs Kokkieshoek

geïnventariseerd door E. Aartse

Terreinomschrijving:

Het geïnventariseerde gebied wordt in het noorden begrensd door de Halfwegseslag, in het oosten door het rijwielpad, in het zuiden door de Langevelderlag en in het westen door de Houtweg.

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 47 ha. Waarvan:

circa 7 ha. Duinberkenbos

circa 15 ha. duindoorn/vlierstruweel

circa 5 ha. stuifzand en stuifplekken

circa 20 ha. open duin met Duinriet, Zandzegge en Helm.

Volgens het beheersplan wordt een beperkte verstuiving toegelaten.

Het terrein is erg geaccidenteerd. Vanaf de Langevelderberg (27 m + NAP) loopt het terrein glooiend af naar de Langevelderslag en de Halfwegseslag. Paden komen in het terrein niet meer voor.

De oude voerbanen zijn thans geheel dichtgegroeid. De Rozendel is nauwelijks meer begaanbaar.

Broedvogels Gijs Kokkieshoek

Soort	Aantal
Houtduif	3
Zomertortel	2
Koekoek	1
Boomleeuwerik	3
Boompieper	2
Graspieper	6
Winterkoning	5
Heggemus	21
Roodborst	2
Nachtegaal	20
Gekraagde Roodstaart	2
Roodborsttapuit	2
Merel	9
Zanglijster	2
Sprinkhaanzanger	2
Braamsluiper	3
Grasmus	21
Zwartkop	2
Bosrietzanger	1
Tjiftjaf	2
Fitis	20
Pimpelmees	1
Koolmees	2
Vlaamse Gaai	1
Ekster	3
Kneu	7
Totaal aantal soorten	26
Totaal aantal broedgevallen	145

Opmerkingen

Doortrekkers

Veldleeuwerik

Op 8 april een zingende Veldleeuwerik bij de Rietkuil. Daarna niet meer gehoord of gezien.

De Veldleeuwerik heeft voor het laatst in 1978 met 2 broedparen gebroed in Gijs Kokkieshoek.

Tapuit

Op 25 april en 4 mei bij het Ronde Bergje een mannetje Tapuit gezien. Geen balts of alarmering waar-genomen noch een vrouwtje. De Tapuit, die voor het laatst in 1998 gebroed heeft ten oosten van deHelmkruidsdel, lijkt nu definitief verdwenen te zijn als broedvogel in Gijs Kokkieshoek.

Wulp

Op 25 april een zingende Wulp boven Langevelderberg. De Wulp heeft voor het laatst in 1991 gebroed.

Broedvogels:

Houtduif

Aantal neemt nu zichtbaar af. Lijkt structureel. Effect van de Havik?

Roodborsttapuit

Het aantal broedparen is sterk teruggelopen. De soort die vanaf 1986 onafgebroken heeft gebroed in de Helmkruidsdel is dit jaar daar niet teruggekeerd.

Bosrietzanger

Deze soort blijft een onregelmatige broedvogel van het Natte Bos. Vaak trekt hij door, soms blijft hij hangen, zoals dit jaar.

Ekster

Het aantal Eksters daalt licht. Evenals bij de Houtduif het effect van de Havik? Wel is geconstateerd dat de Ekster schuwer wordt.

Zwarte Kraai

Dit jaar geen broedgeval. De soort bezocht regelmatig het terrein, maar vloog steeds terug naar de bosrand aan de overzijde van het rijwielpad. Kennelijk was Gijs Kokkieshoek fourageergebied.

2 Boeveld-West

geïventariseerd door W. Baalbergen en J. Veefkind

Terreinomschrijving:

Het geïventariseerde gebied wordt in het Noorden begrensd door het Finnlayweggetje, in het oosten door de Houtweg en een stukje onverhard wandelpad, in het zuiden door het raster langs de Langevelderslag en in het westen door het voormalige Van Limburg Stirumkanaal.

Het onderzochte gebied kan men grofweg in twee delen verdelen. Het zuidelijke deel wordt grotendeels bepaald door een vrij kaal duinenplateau met toppen van 18 m. Het noordelijke deel is begroeid met struweel. De oppervlakte bedraagt circa 28 ha.

De recreatiedruk is er, mede als gevolg van de dichtbij gelegen ingang, groot.

Broedvogels Boeveld-West

Soort	Aantal
Houtduif	1
Koekoek	1
Boomleeuwerik	1

soort	aantal
Boompieper	1
Graspieper	3
Winterkoning	1
Heggemus	8
Nachtegaal	10
Roodborsttapuit	3
Merel	3
Sprinkhaanzanger	1
Grasmus	14
Zwartkop	1
Tjiftjaf	1
Fitis	8
Pimpelmees	2
Koolmees	1
Vlaamse Gaai	1
Ekster	2
Zwarte Kraai	1
Kneu	6
Goudvink	1
Rietgors	1
Totaal aantal soorten	23
Totaal aantal broedgevallen	72

Het tracé van het voormalige Van Limburg Stirumkanaal vertoont, zes jaar na het dempen, langzamerhand wat begroeiing.

Hier en daar is wat Kruiwilg te zien en steken enkele kiemplanten de kop op. Desondanks gaat het volstuiven van de dalen, direct ten oosten van het tracé door.

Het Verbrande Vlak is inmiddels voor een deel onder het zand bedolven. De verwachting dat in dit vlak na het dempen water zou komen te staan is niet uitgekomen. Zelfs in het natte voorjaar en de vrij natte zomer van 2000 is het er niet vochtiger dan voor het dempen.

De afgezaagde bomen van het vlak zijn inmiddels gaan uitlopen. De jonge loten vormen nu een vrij ondoordringbaar bosje, echter nog ongeschikt voor broedvogels.

Wel is na een aantal jaren de Goudvink als broedvogel teruggekeerd. Ook de Rietgors is hier weer tot broeden gekomen, wat oostelijker dan voorheen.

3 Wolfsveld-West

geïventariseerd door B. Heethuis en J. Jacobs

Terreinomschrijving:

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Ruigenhoeker Schulpweg, in het oosten door het

Finnlayweggetje en in het verlengde daarvan door een denkbeeldige lijn over de Kop van het Ronde Vlak en de oostkant van het Spejndel. In het zuiden is het terrein begrensd door het Finnlayweggetje en in het westen door de stuivende zandvlakte van het voormalige Van Limburg Stirumkanaal.

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 35 ha. Hierin liggen vijf dellen n.l. Lange Vlak, Spejndel, Abelendel, Biezenvlakje en Ronde Vlak. Deze dellen bestaan grotendeels uit Meidoorn, Liguster, Berk, Populier, Kardinaalsmuts, Vlier en Duindoorn. Ook het aangrenzende tracé van het Van Limburg Stirumkanaal rekenen we tot het inventarisatiegebied.

Broedvogels Wolfsveld- West

Soort	Aantal
Kleine Plevier	1
Houtduif	2
Zomertortel	1
Koekoek	1
Boomleeuwerik	1
Graspieper	3
Winterkoning	6
Heggemus	16
Nachtegaal	12
Roodborsttapuit	3
Merel	5
Zanglijster	1
Sprinkhaanzanger	1
Braamsluiper	2
Grasmus	17
Tjiftjaf	3
Fitis	14
Pimpelmees	2
Koolmees	3
Vlaamse Gaai	1
Ekster	3
Zwarte Kraai	1
Kneu	6
Rietgors	1
Totaal aantal soorten	24
Totaal aantal broedgevallen	106

Toelichting

Vóór 1995 was het voormalige Van Limburg Stirumkanaal de westelijke grens van ons kavel. In 1990 hebben we langs het kanaal nog een broedgeval gehad van de Wilde Eend.


Na demping van het kanaal hebben we aangrenzende zandvlakte als mogelijk broedgebied meegenomen in onze inventarisaties. We hebben

hierop dit jaar ons eerste broedgeval kunnen noteren, namelijk de Kleine Plevier, met 4 uitgevlogen jongen.

Naast de Kleine Plevier was ook de Zanglijster weer een nieuwe soort in ons kavel.

De Boompieper en de Tuinfluiter zijn uit ons kavel verdwenen, evenals de Fazant. Alhoewel de Fazant voor veel vogeltellers geen serieuze soort is, vinden we het toch jammer dat zo'n markante verschijning uit ons gebied is verdwenen. We hebben het gehele seizoen zelfs in de hele omtrek geen roepende haan meer gehoord.

Het totale aantal broedsels ligt met 106 iets onder het 10-jarig gemiddelde van 112. In de aantallen van de overige soorten is weinig verandering opgetreden.



Zwartkop *Sylvia atricapilla*

4 Westhoek/Haasvelderbeken

geïnterviewd door A. Gort en W. van Leeuwen

Terreinomschrijving:

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Nieuwe Haasvelderweg, in het oosten door de slag van de Westhoek, in het zuiden door de Starrenbroekerweg en in het westen door de Haasvelder Klugtweg.

Het terrein is niet sterk geaccidenteerd. De Trapjesberg is met ruim 16 meter + NAP de hoogste duintop. In de omgeving van het Haasveld zijn nog vele sporen aanwezig van een vroegere landbouwvestiging, zoals oude teelhoeken en weitjes, droge wateringen, greppels en oude beekbeddingen, die in het voorjaar vol met water kunnen staan.

"De vlakke gedeelten zoals de ""Lange Velletjes"" en ""Het Weitje van de Wilgenpoort"" zijn sterk verruigt, " hoewel sommige gedeelten nu worden gemaaid. Het terrein, 55 ha., telt verschillende Pannen en Dellen nl. Pan van de Heiweg,

Berkenpan, Kattendel, Ligusterdel, Pan van Janus en de Wilgenpoort.

Juist in deze gebieden zitten de boomnestbroeders en de holenbroeders, zoals Pimpelmees, Koolmees en Gekraagde Roodstaart. Verder is het terrein heel struweelrijk en zijn sommige looproutes in de loop der jaren geheel geblokkeerd door Duin- en Meidoorn. Het terrein is rijk aan vogels, waarin het broeden van de Fazant sterk terugloopt, in tegenstelling tot de Winterkoning, die dit jaar zijn zege vierde.

Broedvogels Westhoek en Haasvelderbeken

Soort	Aantal
Fazant	3
Houtduif	1
Zomertortel	2
Koekoek	1
Boompieper	10
Graspieper	9
Winterkoning	11
Heggenmus	5
Roodborst	3
Nachtegaal	13
Gekraagde Roodstaart	1
Roodborsttapuit	3
Merel	2
Zanglijster	1
Sprinkhaanzanger	13
Braamsluiper	1
Grasmus	28
Tuinfluiter	1
Zwartkop	1
Tjiftjaf	13
Fitis	46
Pimpelmees	3
Koolmees	9
Vlaamse Gaai	2
Vink	1
Kneu	1
Totaal aantal soorten	26
Totaal aantal broedgevallen	184

5 Hoekgatterduin

geïventariseerd door S. Vos

Terreinomschrijving:

Het onderzochte gebied is c. 50 ha groot. In het noorden en oosten wordt het terrein begrensd door de Hoekgatterweg, in het zuiden door de Zilkerslag (Joppeweg) en in het westen door het Oosterkanaal. Door het gebied lopen enkele zandpaden. Het gebied kenmerkt zich door een rug van vrij kale duinen met veel stuifgaten.

We vinden verspreid over het terrein enkele bosjes van voornamelijk eikenhakhout zoals b.v. het Amerikaanse Bosje. Langs het Oosterkanaal vinden we enkele bosjes van de Oostenrijkse den.

Broedvogels Hoekgatterduin

Soort	Aantal
Nijlgans	1
Bergeend	1
Wilde Eend	2
Kuifeend	3
Fazant	1
Meerkoet	2
Houtduif	5
Koekoek	1
Bosuil	1
Groene Specht	2

Soort	aantal
Grote Bonte Specht	3
Boomleeuwerik	1
Boompieper	9
Winterkoning	12
Heggemus	7
Roodborst	6
Nachtegaal	11
Gekraagde Roodstaart	8
Roodborsttapuit	2
Tapuit	1
Merel	6
Zanglijster	2
Sprinkhaanzanger	1
Grasmus	13
Tuinfluitier	1
Zwartkop	1
Tjiftjaf	3
Fitis	33
Staartmees	3
Pimpelmees	10
Koolmees	20
Wielewaal	1
Vlaamse Gaai	3
Ekster	3
Zwarte Kraai	2
Vink	3
Kneu	2
Totaal aantal soorten	37
Totaal aantal broedgevallen	186

Broedvogels van de 5 kavels in 2000

SOORT/AANTAL	GIJS KOKKIES- HOEK	BOEVELD- WEST	WOLFSVELD- WEST	WESTHOEK HAASVELDER- BEKEN	HOEKGAT- TERDUIN	TOTAAL
Nijlgans					1	1
Bergeend					1	1
Wilde Eend					2	2
Kuifeend					3	3
Fazant				3	1	4
Meerkoet					2	2
Kleine Plevier			1			1
Houtduif	3	1	2	1	5	12
Zomertortel	2		1	2		5
Koekoek	1	1	1	1	1	5
Bosuil					1	1
Groene Specht					2	2
Grote Bonte Specht					3	3
Boomleeuwerik	3	1	1		1	6
Boompieper	2	1		10	9	22
SOORT/AANTAL	GIJS	BOEVELD-	WOLFSVELD-	WESTHOEK	HOEKGAT-	TOTAAL

	KOKKIES- HOEK	WEST	WEST	HAASVELDER- BEKEN	TERDUIN	
Graspieper	6	3	3	9		21
Winterkoning	5	1	6	11	12	35
Heggemus	21	8	16	5	7	57
Roodborst	2			3	6	11
Nachtegaal	20	10	12	13	11	66
Gekraagde Roodstaart	2			1	8	11
Roodborsttapuit	2	3	3	3	2	13
Tapuit					1	1
Merel	9	3	5	2	6	25
Zanglijster	2		1	1	2	6
Sprinkhaanzanger	2	1	1	13	1	18
Bosrietzanger	1					1
Braamsluiper	3		2	1		6
Grasmus	21	14	17	28	13	93
Tuinfluit				1	1	2
Zwartkop	2	1		1	1	5
Tjiftjaf	2	1	3	13	3	22
Fitis	20	8	14	46	33	121
Staartmees					3	3
Pimpelmees	1	2	2	3	10	18
Koolmees	2	1	3	9	20	35
Wielewaal					1	1
Vlaamse Gaai	1	1	1	2	3	8
Ekster	3	2	3		3	11
Zwarte Kraai		1	1		2	4
Vink				1	3	4
Kneu	7	6	6	1	2	22
Goudvink		1				1
Rietgors		1	1			2
Totaal aantal soorten	26	23	24	26	37	44
Totaal aantal broedgevallen	145	72	106	184	186	693

Nieuwe activiteiten in het Jan Verweij Natuurcentrum

Jelle van Dijk

Bij de gebruikelijke lezing op de laatste vrijdag van de maand kost het vrijwel altijd enige moeite om de pauze niet al te zeer te laten uitlopen. Domweg het licht uitdoen is soms het ultieme middel om de aanwezigen weer richting grote zaal te krijgen.

Er is blijkbaar behoefte elkaar wat langer te spreken dan in een pauze van 15-20 minuten mogelijk is. Het bestuur wil hier op inspelen door in dit voorjaar tweemaal een soort inloopochtend te organiseren.

Wat moet je je daar nu bij voorstellen?

Heel eenvoudig: de deur van het centrum staat om 10.00u open voor iedereen, de koffie is klaar en de temperatuur is aangenaam. Natuurlijk is er volop gelegenheid gezellig “bij te kletsen”, waarnemingen uit te wisselen, enz.

Daarnaast willen we op elke ochtend een speciaal thema centraal stellen.

Op de eerste dag, zaterdag 31 maart, is dit het onderwerp *Planten en bomen in het voorjaar*.

Er wordt voor gezorgd dat er vroege bloeiers en uitbottende takken aanwezig zijn. Ook zal er informatie over de zogenaamde stinzenplanten aanwezig zijn.