

In het algemeen kun je zeggen dat de Graspieper en Boompieper in de AWD sterk achteruit zijn gegaan. Maar de winterkoning is toch wel de grootste verliezer. De stevige winter van 2009/2010 met langdurige kou en veel sneeuw heeft een flinke bres van wel 65% geslagen in de populatie. De Rietgors is geheel verdwenen. De Grote Bonte Specht doet het goed, evenals Vink,

Goudvink, Kneu, Zwartkop en Gekraagde Roodstaart. De Zomertortel is helaas nergens meer teruggekeerd.

Alle inventariseerders hebben met veel genoegen aan dit monitoringsproject meegedaan. Ze kijken weer uit naar het volgende voorjaar om opnieuw de AWD-duinen in te gaan.

Broedvogels AWD in 2008 t/m 2010																			
soort	Gijs Kokkieshoek			Boeveld-west			Wolfsveld-west			Westhoek-Haasv.			Hoekgatterduin			Totaal			
dd. 31-10-2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	
Knobbelzwaan													1			1			
Nijlgans													1	1	2	1	1	2	
Wilde Eend																			
Soepeend													1	1	1	1	1	1	
Kuifeend													1	1	2	1	1	2	
Patrijs																			
Fazant	1															1			
Meerkoet													2	4	5	2	4	5	
Kleine Plevier																			
Houtsnip																			
Houdduif	1				1			2	1	1	1	1	1	1	2	3	2	3	
Zomertortel																			
Koekoek	1	1	1	1	1	1			1	1			2	1		4	5	3	
Groene Specht													2	1	2	2	1	2	
Gr. Bonte Specht						1				1	1	1	4	3	5	5	4	7	
Kl. BonteSpecht												1				1			
Boomleeuwerik	6	5	6	1	1	1	2	3	4	4	2	3	6	2	2	19	13	16	
Boompieper	2		1						2	8	9	6	21	13	10	31	24	17	
Graspieper	4	2	2	3	2	3		3	1	1	3	1				8	10	7	
Witte Kwikstaart												1						1	
Winterkoning	4	2	2	1	1			5	5	1	5	6	1	6	6	3	21	20	7
Heggenmus	14	9	9	5	7	6	7	15	12	8	6	4	8	8	6	42	45	37	
Roodborst	1	3	1	1	1	1			1	2	2	1	3	4	3	6	10	7	
Nachtegaal	14	14	12	7	10	8	14	24	16	6	8	6	11	11	14	52	67	56	
Blauborst								1	1									1	
Gekr. Roodstaart			1	1	1				1	5	6	11	2	5	5	8	12	18	
Roodborsttapuit	1	3	3	1	2	2	1	3	2	3	2	3	4	2	2	10	12	12	
Tapuit	1															1			
Merel	5	5	5	3	4	4	6	6	6	3	7	7	9	9	8	26	31	30	
Zanglijster	2	1	2		1			3	2	3	2		3	2	1	5	7	5	
Grote Lijster										1						1			
Sprinkhaanzanger	1					1		2					2	1	3	3	3	4	
Spotvogel																1		1	
Braamsluiper	3	3	3	2	1	1	2	4	5	1	2	1	7	2	6	15	12	16	
Grasmus	10	11	12	8	8	9	10	23	24	5	6	11	21	21	17	54	69	73	
Tuinfluter				1	2	1	3	2	1				1	4	4	5	8	6	
Zwartkop	1	1	2			1			1	1		1	5	3	4	7	4	9	
Tijtjaf	2	2	1	2	1	1	3	4	2	6	2	1	8	2	4	21	11	9	
Fitis	15	11	12	14	11	14	18	22	19	23	20	17	38	38	32	108	102	94	
Staatmees	2	1						1	1	1	2	3	2	3	3	5	7	7	
Glanskop	1	1								1	1		2	1	3	4	3	3	
Kuifmees													1			1			
Pimpelmees	1	2	2	1	1	1	2	2		6	7	4	6	8	9	16	20	16	
Koolmees	8	4	3	3	2	3	3	6	15	17	14	11	10	11	12	41	37	44	
Wielewaal															1			1	
Boomkruiper		1																1	
Gaai	2	1	2	1	1	1	4	3	3	2	2	2	2	3	3	11	10	11	
Ekster	1	1	2		1	1	1	2	2	1		1	2	1		5	5	6	
Zwarte Kraai	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	4	3	6	11	9	
Spreeuw										1			2			3			
Vink	1	2	2	2	1	4	3	5	6	7	9	8	5	8	10	18	25	30	
Groenling													1			1			
Kneu	5	4	5	3	2	5		5	4	3	4	3	3	2	2	14	17	19	
Goudvink		1					1		1			1	1		2	2	1	4	
Rietgors									1									1	
aantal soorten	29	26	24	20	24	23	19	27	27	30	26	27	37	34	34	43	40	39	
aantal territoria	111	93	93	61	64	71	88	151	135	128	127	112	207	187	192	595	622	603	

Inventarisatie broedvogels 2010 in Gijs Kokkieshoek

door Erwina Teunissen en Annelies Marijnjs

Tussen 7 maart en 19 juni werd ons gebied in de AWD 11 maal bezocht. Het was weer een redelijk koud voorjaar. Al bij ons eerste bezoek op 7 maart bleek dat de Boomleeuweriken hun territoria al weer hadden ingenomen. Er bleken uiteindelijk 6 paartjes in het gebied aanwezig. Ook werden er die

eerste ochtend 2 Damherten en een broodmager Reebokje gezien.

Halverwege die maand maart, op de plek waar ik een week eerder de prachtige zang van een Gaai had gehoord, lag nu een plukplek, een Gaai. De vogel heb ik daarna niet meer gehoord.

Wat opvalt dit jaar is dat de in 2009 nieuwe soort, de Boomkruiper, weer is verdwenen. Op 6 april zagen wij hoopvol een paartje Bergeend maar het bleef bij die ene keer. Ook de Goudvink van 2009 was weer verdwenen. De Boompieper was weer terug met 1 territorium. De Zomertortel, die ik 1

keer heb gehoord, net buiten de grens van Gijs Kokkieshoek, is ook nog steeds verdwenen. De Tapuit, waarvan op 7 mei 3 a 4 paartjes en enkele solitaire mannetjes en vrouwtjes door ons werden gezien, kwam ook niet tot broeden. Wel konden wij gedurende de vele inventarisaties genieten van de Gekraagde Roodstaart waarvan met zekerheid 1 territorium is vastgesteld. De vogel was prachtig te zien in de top van een boom bij de ingang Langeveld.

Inventarisatie broedvogels 2010 in Boeveld West

door Jan Veefkind en Willem Baalbergen

Er hebben zich dit jaar geen grote veranderingen voorgedaan maar er zijn toch wel enkele opvallende zaken. Voor het eerst sinds het begin van de inventarisatie is in het gebied een broedgeval van een Bonte Specht vastgesteld. De oudere bomen rond het Finley-weggetje bieden hiervoor inmiddels mogelijkheden.

Het lijkt erop dat Zwartkop en Tuinfluiter onregelmatig in het Verbrande Vlak tot broeden komen.

De Graspiepers waren het gehele broedseizoen in het veld aanwezig, maar ze zongen nauwelijks. Pas aan het einde van het seizoen werden ze gehoord.

De Gekraagde Roodstaart werd slechts één maal, voor de datumgrens, in het Verbrande Vlak gehoord.

Tot 5 mei werden Tapuiten in het gebied gezien, daarna niet meer.

De Vink ontwikkelt zich van parkvogel steeds meer tot een vogel van het duin. Het hoger worden van bomen en struiken speelt daarbij waarschijnlijk een rol.

Door het, in tegenstelling tot de verwachting, droger worden van het Verbrande Vlak is de Rietgors als broedvogel verdwenen.

Broedvogelinventarisatie AWD Wolfsveld-West 2010

Geïnterviewd door Jaap Eisenga, Pieter de Jong en Koene Vegter (verslag)

Terreinomschrijving

Het Wolfsveld ligt met zijn 35 hectare langs het voormalige Van Limburg Stirumkanaal en wordt verder begrensd door het Finleyweggetje aan de zuidoostkant en de Ruigenhoeker Schulpweg in het noorden. Het is een redelijk geaccidenteerd terrein met een vijftal dellen, zoals het Abelendel, het Spejndel en het Ronde Vlak, met een variatie aan

begroeiing van Meidoorn, Berk, Duinliguster, Vlier, Ratelpopulier en oprukkende Duindoorn.

Toelichting op de inventarisatie 2010

In totaal werden er tussen 7 en 10 uur 's ochtends 12 bezoeken gebracht aan dit fraaie en afwisselende gebied onder meest mooie omstandigheden bij gemiddeld een graad of 6. De eerste helft meer bewolking en matige wind uit de zuidwesthoek; de tweede helft meestal onbewolkt en geringe wind uit de noordoosthoek. Met in totaal 26 soorten en 134 territoria is met name het aantal territoria iets lager dan in 2009 (151) maar in vergelijking met de afgelopen 10 jaar (gemiddeld circa 110) nog steeds aan de hoge kant. Het aantal soorten is met een gemiddelde van ongeveer 25 wel redelijk constant over die periode. In het begin waren het vooral de Vink en de Koolmees – uitschieter naar 15 – die de aandacht opeisten, gevolgd door de Heggenmus (12) om uiteindelijk bij de gebruikelijke top drie voor deze biotoop te belanden bestaande uit Fitis, Nachtegaal en Grasmus met resp. 19, 16 en 24 broedgevallen. Totaal 59 tegen 69 in 2009. Gelukkig kon ook weer twee keer net als vorig jaar in het Biezenvlak in de noordwesthoek van het gebied nabij onze koffiehok een paartje Blauwborst worden gesignaleerd. Zoiets vergoedt toch veel vroeg opstaan. In het randgebied bij het Finleyweggetje werden een enkele Zwartkop, Tuinfluiter, Staartmees en voor ons voor het eerst een Goudvink gezien (in de afgelopen 20 jaar in totaal 4 keer als broedvogel). Ook de Gekraagde Roodstaart kon weer als broedgeval worden genoteerd. Wel waargenomen maar buiten de datumgrenzen vallend: Rietgors, Grote Bonte Specht, Goudhaan, Sprinkhaanzanger, Roodborst en Tapuit. Geen Boompieper of Pimpelmees dit jaar. Overvliëgend konden nog worden genoteerd: Aalscholver, Knobbelzwaan, Boerenzwaluw, Grauwe Gans, Bergeend, Visdief, Holenduif, Boomvalk, Havik, Sperwer, Houtsnip, Buizerd, Nijlgans en Canadese Gans.

Ook werden we af en toe aangenaam verrast door opduikende dan wel wegsprintende Reeën of Damherten.

U ziet naast het inventariseren van broedgevallen valt er in alle vroegte nog heel wat meer te beleven in de Waterleidingduinen en wij gaan dan ook zeker en met enthousiasme door in 2011.

Broedvogel inventarisatie Hoegatterduin 2008 t/m 2010

Leo Schaap en George Hageman

Dit is al weer het derde jaar dat Leo Schaap en George Hageman het gebied Hoegatterduin