

Conclusie

Het was weer een bijzonder inventarisatie jaar. Het weer werkte niet altijd mee en heeft mogelijk de tellingen aan de magere kant gehouden.

Het is een jaar met een aantal bijzondere waarnemingen zoals de grondbroeders in De Westhoek, de Torenvalk en de Sijtsjes in het Hoekgatterduin en de Bosrietzanger in Gij's Kokkies Hoek. Het is zeer verheugend dat er in De Westhoek na allerlei ingrepen een herstel optreedt. Over een aantal soorten moeten we ons zorgen maken. De Nachtegaal neemt in de AWD sterk af terwijl er landelijk

een matige afname wordt gerapporteerd. Ook de Fitis, de meest voorkomende vogel in het duin, doet het de laatste jaren erg slecht terwijl er landelijk een matige toename wordt gerapporteerd. De Sprinkhaanzanger doet het ronduit slecht, terwijl ook voor deze vogel een matige toename landelijk wordt gerapporteerd. Ook de Kneu doet het soms erg slecht in het duin, zie Wolfsveld, en op andere plaatsen vertoont deze soort een lichte achteruitgang. De Grasmus doet het soms heel slecht en soms goed, net als een groot aantal andere soorten. Gekraagde Roodstaart en Boomleeuwrik doen het uitgesproken goed, positiever dan de landelijke trends aangeven.



Glanskop in ZHL Vogelaardreef, foto Gab de Croock

Broedvogelinventarisatie AWD Wolfsveld-West 2016

Geïnterviewd door Jaap Eisenga, Wim Plaatzer en Koene Vegter (verslag/foto's)

Terreinomschrijving/algemeen

Het Wolfsveld ligt met zijn 35 hectare langs het voormalige Van Limburg Stirumkanaal en wordt verder begrensd door het Finleyweggetje aan de zuidoostkant en de Ruigenhoeker Schulpweg in het noorden. Het is een afwisselend geaccidenteerd terrein met een vijftal dellen, waaronder het Abelendel, het Spejndel, het Biezenvlak en het Ronde Vlak, met een variatie aan begroeiing van Meidoorn, Berk, Duinliguster, Vlier, Ratelpopulier en oprukkende Duindoorn.

Twee jaar geleden is de basisbegroeiing van lage struiken en riet op een aantal plaatsen in dellen grondig verwijderd. Dit laat nog steeds zijn sporen na en verklaart mogelijk

mede het geringer aantal territoria in 2016. Daarnaast valt ook het effect van het hoge tonenverlies – boven 4 kHz – bij de oudere waarnemer niet geheel uit te sluiten (bron: art. Volkskrant/rubriek Wetenschap 11 juni 2016).

Toelichting op de inventarisatie 2016

De weersomstandigheden waren dit jaar wat beter dan het voorgaande jaar: gemiddeld warmer (8°) en ook minder wind (windkracht 3 gemiddeld).

In de voorafgaande periode is nogal wat regen gevallen, zodat in diverse dellen poelen zijn ontstaan die aan het eind van onze inventarisatieperiode meestal weer zijn verdwenen.

Twee keer worden wij behoorlijk belemmerd door windkracht 5-6 en één keer blazen wij vanwege de regen af, terwijl wij ook zelf nog even op trek gaan - naar

zuidelijker streken dan - in de tweede helft van mei. In totaal hebben wij in de periode medio maart tot medio juni 2016 tussen 7 en 10 uur 's ochtends 10 bezoeken gebracht aan dit afwisselende duingebied. Uiteindelijk leidt dit in 2016 tot in totaal 26 soorten met 121 territoria, waarbij in vergelijking met 2015 weer van een stijging in aantal soorten maar van een daling in aantal territoria sprake is (in 2015: 21 soorten en 147 territoria). Zoals elk jaar weer zijn het in het begin van de inventarisatierondes vooral de Heggenmus met 14 broedgevallen (18 in 2015), de Koolmees met 8 (11 in 2015) en de Vink met 12 (11 in 2015) die zich laten horen en zien. Zowel Heggenmus als Koolmees blijven hiermee duidelijk achter bij vorig jaar. Later in het broedseizoen bestaat de gebruikelijke top drie voor dit biotoop opnieuw uit Grasmus, Fitis en Nachtegaal met resp. 15, 15 en 12 broedgevallen, versus 22, 21 en 17 in 2015. Hieruit blijkt dat ook hier de broedresultaten bij deze drie toppers in 2016 duidelijk lager zijn geworden. De Merel scoort met 8 vergelijkbaar met de 7 broedgevallen in 2015, maar het resultaat van de Kneu is met 1 broedgeval veel lager dan in 2015 (8). Daarnaast komt in dit gebied een aantal vogelsoorten voor met kleine aantallen territoria, waarvan het elk jaar weer spannend is in hoeverre ze, al dan niet zijn op te sporen en waar te nemen. Dit jaar gaat het in positieve zin om de Tjiftjaf (2), Winterkoning (3), Zwarte Kraai (1),

Roodborsttapuit (1), Vlaamse Gaai (1), Gekraagde Roodstaart (3), Koekoek (2), Boompieper (2), Graspieper (4), Braamsluiper (2), Boomleeuwerik (4), Pimpelmees (4), Roodborst (1), Sprinkhaanzanger (1), Nijlgans (1), Houtduif (2), Zwartkop (1) en gelukkig weer de Blauwborst (1).

Nieuw was dit jaar de Turkse Tortel: 1 x waargenomen op onze laatste teldag medio juni.

Buiten de datumgrenzen en/of criteria vallend zijn dit jaar waargenomen: Zanglijster (1 x in maart), Tapuit (1 x medio mei) en een groepje van 7 Beflijsters eind april. In vergelijking met positieve resultaten in de voorgaande jaren zijn helemaal niet gezien Tuinfluiter, Staartmees, Rietgors en Goudvink.

Overvliend zijn in deze periode nog waargenomen: Zilvermeeuw, Witte Kwikstaart, Aalscholver, Boerenzwaluw, Visdief, Buizerd, Bruine Kiekendief, Gierzwaluw en eind april twee keer een groep Kramsvogels van resp. 40 en 15 exemplaren.

De totalen van de zoogdieren waren in 2016 als volgt: 107 Damherten, 56 Konijnen, 2 Vossen en dan zagen wij op onze laatste telochtend – weliswaar net buiten het inventarisatiegebied maar toch! - een Ree met haar zogend kalf: zonder meer een mooie opmaat voor onze rondes in het Wolfsveld in het komende jaar.



Een nat en dor begin...



Maar een droog en groen einde in het Ronde vlak – met teller WP