

Broedvogelinventarisatie AWD Wolfsveld-West 2017

Geïnterviewd door Jaap Eisenga, Wim Plaatzer
en Koene Vegter (verslag/foto's)

Terreinomschrijving/algemeen

Het Wolfsveld ligt met zijn 35 hectaren langs het voormalige Van Limburg Stirumkanaal en wordt verder begrensd door het Finleyweggetje aan de zuidoostkant en de Ruigenhoeker Schulpweg in het noorden. Het is een afwisselend geaccidenteerd terrein met een vijftal dellen, waaronder het Abelendel, het Spejendel, het Biezenvlak en het Ronde Vlak met een variatie aan begroeiing van Meidoorn, Berk, Duinliguster, Vlier, Ratelpopulier en oprukkende Duindoorn.

De basisbegroeiing van lage struiken en riet is enkele jaren geleden in diverse dellen grondig verwijderd. Dit laat nog steeds zijn sporen na en zorgt niet direct voor meer territoria in 2017.

Toelichting op de inventarisatie 2017

Het lopende inventarisatiejaar laat zich kennen door een relatief koud voorjaar en weinig neerslag. In tegenstelling tot vorig jaar komen er nauwelijks onbewolkte ochtenden voor. De wind, die nogal eens uit het noorden komt, zorgt wel voor frisse lucht met soms fraaie wolkenpartijen.

In totaal hebben wij in de periode medio maart tot eind mei 2017, tussen 7 en 10 uur 's ochtends, 10 bezoeken gebracht aan dit afwisselende duingebied. Uiteindelijk leidt dit in 2017 tot in totaal 23 soorten met 128 territoria, waarmee, in vergelijking met 2016, sprake is van een lichte daling in aantal soorten maar van een bescheiden stijging in aantal territoria (in 2016: 26 soorten en 121 territoria).

Zoals elk jaar weer zijn het in het begin van de inventarisatierondes vooral de Heggenmus met 13 broedgevallen (14 in 2016), de Koolmees met 11 (8 in 2016) en de Vink met 13 (12 in 2016) die zich laten horen en zien. Vooral de Koolmees scoort hiermee hoger dan vorig jaar.

Later in het broedseizoen bestaat de gebruikelijke top drie voor deze biotoop opnieuw uit Fitis, Nachtegaal en Grasmus met resp. 21, 15 en 13 broedgevallen, versus 15, 12 en 15 in 2016.

Op langere termijn bezien blijkt het beeld bij de Fitis redelijk stabiel, maar is bij de Grasmus - en eigenlijk ook de Nachtegaal - sprake van een doorzettende daling.

De Merel scoort met 7 marginaal lager dan de 8 broedgevallen in 2016 en het resultaat van de Kneu is met 5 broedgevallen duidelijk gestegen ten opzichte van het ene broedgeval van 2016.

Daarnaast komt in dit gebied een aantal vogelsoorten voor met kleine aantallen territoria, waarbij we elk jaar weer benieuwd zijn in hoeverre ze al dan niet zijn op te sporen en waar te nemen.

Dit jaar gaat het in positieve zin om:

- Tjiftjaf (2)
- Winterkoning (4)
- Zwarte Kraai (1)
- Roodborsttapuit (2)
- Vlaamse Gaai (1)
- Gekraagde Roodstaart (1)
- Boompieper (2)
- Braamsluiper (3)
- Boomleeuwerik (5)
- Pimpelmees (3)
- Roodborst (1)
- Houtduif (2)
- Zwartkop (1)
- Nijlgans (1)
- Sprinkhaanzanger (1)

Buiten de datumgrenzen en/of criteria vallend zijn dit jaar waargenomen: Goudhaan en Tapuit. Een Tapuit is dit jaar slechts één keer gezien - symptomatisch voor de algehele duinsituatie. Helemaal niet gezien geldt voor: Graspieper en Blauwborst (afgelopen jaren regelmatig wel gezien), Koekoek (alleen in de verre verte gehoord) en Staartmees, Rietgors, Tuinfluiter en Goudvink (al meerder jaren niet meer gezien).

Overvliegend zijn in deze periode waargenomen: Zilvermeeuw, Aalscholver, Holenduif, Torenvalk, Boeren- en Gierzwaluw, Visdief, Grauwe Gans en een mooie groep overwikkende Knobbelzwanen.

De totalen van gespotte zoogdieren zijn in 2017 als volgt: ca. 50 Konijnen en ca. 150 Damherten: ondanks het gestarte afschot toch nog vrij veel herten. Vossen of Reeën zagen wij dit jaar helaas niet.



Mooie wolkenluchten tijdens een frisse ochtend bij het Spejndel



Koffiepauze in het Biezenvlak met lichte miezer (JE en WP)

