

juli. Over de maanden augustus tot en met december is het percentage adulte mannetjes 16% en over de maanden januari tot en met april 23%. Dat vanaf augustus het percentage mannetjes afneemt is uiteraard het gevolg van het uitvliegen van de jongen. Ook is het mogelijk dat onder de trekvogels die 's winters in de provincie Groningen pleisteren meer juvenielen en/of wijfjes zijn.

Tussen de eerder genoemde gebieden blijken geen duidelijke verschillen in percentage mannetjes te bestaan. Wel is bij het Zuidlaardermeer gekonstateerd dat de wijfjes (of juvenielen) vaker boven de rietkragen foerageren en de mannetjes meer de kale weidegebieden in de richting van Onnen opzoeken. Ook in de Lauwersmeer foerageren de mannetjes relatief meer boven de kale gedeeltes, dat is hier het landbouwgebied. Bij overwinterende Blauwe Kiekendieven in de Flevopolders is ook gekonstateerd dat de wijfjes (juvenielen) vaker boven hogere, vertikaal gestructureerde vegetatie jagen en de mannetjes boven kale gebieden of lage vegetatie (Schipper e.a. 1975).

Vermoedelijk hebben individuele Blauwe Kiekendieven een vast jachtgebied dat ze misschien de hele winter door benutten. Hiervoor pleit een enkel gegeven: tussen 16 januari en 6 maart 1977 werd een individueel herkenbaar wijfje regelmatig ten noordwesten van het Zuidlaardermeer gezien (E.J. Boekema).

Hoewel de Blauwe Kiekendief een solitaire jager is, wordt er op gemeenschappelijke slaappleatsen overnacht. Deze zijn bekend van de Lauwersmeer en het Zuidlaardermeer, op beide plaatsen overnachten Blauwe Kiekendieven in open rietland; in de Lauwersmeer in de herfst samen met Bruine Kiekendieven (M.R. van Eerden).


E.J. Boekema

#### NESTKASTEN ONDERZOEK

Jan Glas

Willen alle avifaunisten die op enigerlei wijze aan nestkasten werk doen, de verzamelde broedresultaten na afloop van het seizoen aan mij doen toekomen. Ook gegevens van verwante verenigingen zijn welkom. Het is niet de bedoeling om resultaten van ieder kastje bij U in de tuin te vermelden, of het moeten al bijzonderheden zijn.

Voor een totaal overzicht, dat in de Grauwe Gors zal worden gepubliceerd, zijn de volgende gegevens van belang:



1. Naam werkgroep of personen
2. Plaats waar de kastjes hangen en soort begroeiing
3. Aantal kastjes en grootte van het gebied in ha.
4. Model kast, ongeveer de inhoud en de  $\emptyset$  van het vlieggat
5. Broedresultaat per kastje, controle-datum, vogelsoort en aantal eitjes of jongen

Bij voorbaat dank.

Adres:  
Kappershuttenweg 5  
9627 TD Hellum Gr.