

Literatuur:

- Bauer, Kurt M. und Urs N. Glutz von Blotzheim, 1968. Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Band 2, 1. Teil. Frankfurt am Main.
- Dijk, Klaas van en Sjoerd Dirksen, 1979. Watervogels in de stad Groningen in de strengelwinter 1978/1979. *Aythya* 18 (2): 17-28.
- Hilprecht, A., 1970. Höckerschwan, Singschwan und Zwergschwan. Neue Brehm Bücherei 155.
- Spray, Chris, 1978. Swan. Upping, Hebridean Style. *BTO News* 97: 6-7.

Adres:

Van Heemskerckstraat 1-608
050-134689

LEZING OVER 'DE VOGELS VAN DE PYRENEEËN'

Egge Boerma

op 15 februari 1980 door Jan Hulscher en
Maarten Platteeuw

Deze lezing trok veel belangstelling; er waren 63 personen aanwezig, leden en studenten.

Eens in de twee jaar gaat Jan Hulscher met studenten naar de Pyreneeën om daar vogels waar te nemen en hun gedrag vast te leggen. De centrale vraagstelling van deze exkursies is: hoe is het dier aangepast aan zijn omgeving?

Na het behandelen van diverse voorbeelden over dit onderwerp, werd een serie dia's vertoond, van commentaar voorzien door Maarten Platteeuw. Er moest regelmatig geraden worden naar de identiteit van de vogels.

Het gebied dat bezocht is ligt ten noorden van Jaca, nabij het dorpje Hecho. Het kamp werd opgeslagen op ca. 1200 m hoogte.

Nabij Jaca, langs een rivierbedding, werden Bijeneters, Oeverzwaluwen, Boomleeuweriken, Duinpiepers, Rode Patrijs, Kwartel, Cirilgors, Grijs Gors en Thekla (of Kuif-?)leeuwerik waargenomen. Een raadsel was de afgedwaalde Kleine Mantelmeeuw, die daar vertoefde op een stuwmeer. Ook weden, in de lagere regionen, Orpheusspotvogel, Waaijerstaartrietzanger, Cetti's Zanger, Zwarte Spreeuw, Blonde Tapuit (beide vormen) en de Rode Wouw waargenomen.

Wat hoger op werden, langs de rivier, Gele Kwikstaart, IJsvogel, Draaihals en Grote Gele Kwikstaart signaleerd.

Op 1600 m hoogte, in een beukenbos, werden Groene Specht, Boomklever, (Taiga)boomkruiper opgemerkt. De Bosuil werd vanuit de tent gehoord.

Er waren minimaal 3 exemplaren. In de sparrenbossen konden zij noteren: Citroensijs, Europese Kanarie; hogerop nog Zwarte Roodstaart, Waterpieper en Graspieper. In de alpiene zone werden Alpenkauw, Alpenkraai, en Alpen gierzwaluw genoteerd. In andere jaren werden ook Sneeuwvink en Alpensneeuhoen waargenomen.

Het was een interessante avond.