

# Terugblik op de National

Het weekend van 23 juni vond de veertiende Nationale Nachtvliedernacht plaats. Op 48 locaties werden openbare excursies georganiseerd, maar er werden op veel meer plekken naar nachtvlieders gekeken. Het was vrij koud, wat niet optimaal is om veel soorten nachtvlieders te zien. Toch zijn er in totaal 769 verschillende soorten nachtvlieders doorgegeven.

**Tekst:** Op 48 locaties openbare excursies is een mooi aantal, zeker omdat er vaak tientallen mensen per locatie op bezoek kwamen. Zo kregen er op verschillende locaties veel mensen voor het eerst prachtige nachtvlieders te zien, wat voor hen weer erg leuke en verrassende inzichten opleverde. Naast de openbare excursies zijn er in maar liefst 969 verschillende kilometerhokken in Nederland waarnemingen van nachtvlieders doorgegeven. In alle hokken samen zijn tijdens het weekend van de Nationale Nachtvliedernacht in totaal 769 verschillende soorten nachtvlieders waargenomen. Om tot dit aantal te komen zijn alle waarnemingen van imago's gebruikt die zijn ingevoerd op waarneming.nl, telmee.nl en los zijn doorgegeven. De 769 soorten zijn onder te verdelen in 371 soorten macronachtvlieders en 398 soorten microvlieders.

Om te bepalen welke soort het meest algemeen was, kun je onderscheid maken in algemeenheid in verspreiding en algemeenheid in aantal exemplaren. Een soort kan heel wijdverspreid door Nederland



Jurriën van Deijk

De buxusmot rukt snel op richting eerste plaats bij de micro's.

Tellingen tijdens Nationale Nachtvliedernacht		
	macro	micro
aantal waarnemingen	4525	2514
aantal soorten	371	398
aantal kilometerhokken	776	487
aantal exemplaren	8484	5238



Jurriën van Deijk

Het gebruikelijke beeld van de nachtvliedernacht: veel belangstellenden bij lamp en laken.

# e Nachtvliedernacht

<b>Macronachtvlinders:</b> Aantal kilometerhokken en het totaal aantal exemplaren dat is waargenomen.			
soort	wetenschappelijke naam	kilometerhokken	aantal exemplaren
gamma-uil	<i>Autographa gamma</i>	138	271
grijze stipspanner	<i>Idaea aversata</i>	106	216
huismoeder	<i>Noctua pronuba</i>	99	273
gerande spanner	<i>Lomaspilis marginata</i>	87	180
gewone stofuil	<i>Hoplodrina octogenaria</i>	85	396
sint-jansvlinder	<i>Zygaena filipendulae</i>	72	337
graswortelvlinder	<i>Apamea monoglypha</i>	64	114
kleine zomervlinder	<i>Hemitea aestivaria</i>	63	110
gewone worteluil	<i>Agrotis exclamationis</i>	60	207
houtspaander	<i>Axylia putris</i>	58	127



Huismoeder.

Jurrien van Deijk



Vogelkersstippelmot.

Cuus Dekkers

<b>Microvlinders:</b> Aantal kilometerhokken en het totaal aantal exemplaren dat is waargenomen.			
soort	wetenschappelijke naam	kilometerhokken	aantal exemplaren
vogelkersstippelmot	<i>Yponomeuta evonymella</i>	96	881
bonte brandnetelmot	<i>Anania hortulata</i>	83	166
gewone grasmot	<i>Chrysoteuchia culmella</i>	72	258
buxusmot	<i>Cydalima perspectalis</i>	52	146
bleke grasmot	<i>Crambus perlella</i>	50	103
strooiselmot	<i>Endotricha flammealis</i>	45	69
vroege granietmot	<i>Scoparia ambigualis</i>	43	81
gevlamde bladroller	<i>Archips xylosteana</i>	41	92
brandnetelbladroller	<i>Celypha lacunana</i>	39	73
zilverstreepgrasmot	<i>Crambus pascuella</i>	36	177

voorkomen (dus in veel kilometerhokken), maar hoeft daarbij niet in grote aantallen per locatie te worden gezien (zie het totaal aantal exemplaren in de tabel). Van de macronachtvlinders is de gamma-uil het meest verspreid waargenomen, wat logisch is, aangezien het een zeer algemene trekvlinder is. Van de sint-jansvlinder zijn de meeste individuen waargenomen, voornamelijk overdag.

Bij de microvlinders is de vogelkersstippelmot zowel qua verspreiding als qua aantallen het meeste waargenomen. Een opvallende soort die de laatste jaren vooral in het zuiden van het land steeds meer wordt waargenomen is de buxusmot. Deze micro neemt de laatste jaren zo snel in aantal toe dat het waarschijnlijk niet lang meer duurt voordat hij op nummer 1 staat. Meer informatie over deze vlinder is te vinden op [www.vlinderstichting.nl/buxusmot](http://www.vlinderstichting.nl/buxusmot).

## Enkele zeldzaamheden

Er zijn niet alleen maar algemene soorten waargenomen in het weekend van de Nachtvliedernacht. In Schoorl en in De Wolden werd de bochtige smele-uil (*Photodes minima*) waargenomen. In Rouveen werden twee moeras-w-uilen (*Lacanobia splendens*) gezien, in Arcen een pijpenstro-uil (*Apamea aquila*), in Rijssen een wollegras-uil (*Celaena haworthii*) en in de Naturentuin Goirle werd een teunisbloempijlstaart (*Proserpinus proserpina*) waargenomen.

Tot slot: alle mensen die hun waarnemingen door hebben gegeven: hartelijk dank!