

VAN DE REDAKTIE

Als deze Strandloper bij u in de bus valt, zit voor een aantal medewerkers de broedvogelinventarisatie er bijna weer op. De tijd gaat snel!.

Dit 2e nummer van 1988 is weer zeer afwisselend. STIVONO kijkt tereug op de olieramp in Zeeland begin dit jaar. K.A.Kok vraagt zich af waarom hij de Strandloper leest en Marinus Deever neemt ons mee naar de Ierse Venen. Kees Verweij gaat nog verder en doet uitgebreid verslag van een excursie naar Spanje, terwijl Jan Aartse niet verder komt dan de AW-duinen. De duinen blijven boeien want ook M.Koning wijdt een heel artikel over dit uniek natuurgebied.


Ook de lijst met waarnemingen is deze keer langer dan andere keren. Volgens de samenstellers van de nieuwe Vogels van Noordwijk kunnen deze lijsten niet lang genoeg zijn. Een oproep om toch vooral de maandelijks waarnemingen in te zenden is zeker op zijn plaats.

De kopy voor de volgende Strandloper dient u vóór 25 augustus 1988 ingeleverd te hebben bij Coby van Dijk, Leendert Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk.

De redactie wanst u allen prettige zomermaanden toe met veel goed weer en veel leuke waarnemingen.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

de strandloper



vereniging voor natuur- en
vogelbescherming noordwijk

20^e jaargang mei 1988

BIJ DE VOORPLAAT

Bollenvelden zijn over het algemeen arm aan broedvogels. Naast Veldleeuwerik, Patrijs, Scholekster, Kievit en Witte Kwikstaart behoort de Gele Kwikstaart hier tot de broedvogels. Gele Kwikstaarten zijn zomergasten, die meestal in april arriveren en in oktober al weer vertrokken zijn naar warmer streken. De Engelse Gele Kwikstaart is een van de vele ondersoorten van de Gele Kwikstaart en het mannetje onderscheidt zich van de "gewone" Gele Kwikstaart door de kleur van de kop: deze is ook boven het oog geelgroen. Bij de gewone Gele Kwikstaart is dit gedeelte grijsblauw gekleurd. De vrouwtjes zijn in het veld niet van elkaar te onderscheiden. De Engelse Gele Kwikstaart is in Nederland een schaarse broedvogel met 200- 350 paren in Nederland, terwijl de gewone Gele Kwikstaart een talrijke broedvogel is. Beide broeden in onze omgeving vooral in tulpenvelden, maar de Engelse ondersoort is in Nederland beperkt tot de kuststrook, die aansluit bij zijn hoofdverspreidingsgebied in Engeland.