

## VAN DE REDAKTIE

Voor u ligt al weer de laatste STRANDLOPER van 1988. Wat gaat zo'n jaar toch vlug voorbij!

De najaarstrek is weer voorbij. De broedvogelinventarisaties zijn ingeleverd en de werkgroep "De Vogels van Noordwijk" is druk bezig deze laatste gegevens te verwerken voor de nieuwe uitgaven van "DE VOGELS VAN NOORDWIJK". Gepland is om deze zeer gewijzigde heruitgave in het voorjaar van 1989 te doen uitkomen.

De Vereniging gonst weer van activiteiten. Een gezond teken!

Voor dit laatste nummer van 1988 hebben tal van schrijvers hun best weer gedaan om er een informatieve en lezenswaardige STRANDLOPER van te maken. Hartelijk dank!

Zo gaat Hein Verkade nader in op de vele waarnemingen van de Ooievaars in de Bollenstreek, hetgeen resulteerde in een heus broedgeval in het Lissersbos. Joan van Sambeek kijkt terug op de IVN-dag in Amsterdam en M.Koning duikt in de historie van de honingbij. Jelle van Dijk vergelijkt de broedvogelstand van Berkheide met de Noordduinen en de AW-duinen en Jan Jacobds doet verslag van de vogels die tijdens vissen te zien waren ver voorbij het z.g.REM-eiland.


Uiteraard weer een bijdrage van Karel Kok, het vogelasiel en een opsomming van de vele waarnemingen in en rondom Noordwijk die zoals steeds op voortreffelijke wijze door Jan Glasbergen wordt samengesteld.

Alle schrijvers hartelijk dank hiervoor. De redactie ziet 1989 dan ook met vertrouwen tegemoet.

De redactie wenst alle leden en donateurs prettige feestdagen en een goede jaarwisseling en hoopt in 1989 weer veel kopy te mogen ontvangen.

De redactie.

## de strandloper



vereniging voor natuur- en  
vogelbescherming noordwijk

20° jaargang december 1988

## BIJ DE VOORPLAAT

De Bonte Kraai is tegenwoordig in onze omgeving doortrekker en wintergast in klein aantal. Vanaf de tweede helft van oktober tot in april overwintert de soort vooral in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Vaak is hij dan ook te zien op het strand, in gezelschap van Eksters, waar de vogels zich te goed doen aan kadavers van vissen, vogels en schelpdieren.

De zuidwest grens van het broedgebied van de Bonte Kraai bevindt zich ongeveer ter hoogte van de Waddeneilanden. Hier broedt de soort onregelmatig, vaak gemengd met de nauw verwante Zwarte Kraai, die bij ons een algemene broedvogel is.

Jan Verweij zag op een novemberdag in 1917 naar schatting 9.000 vogels voorbij komen. Deze aantallen zullen wel voorgoed tot het verleden behoren. Toch is de Bonte Kraai in zijn broedgebieden vermoedelijk niet in aantal afgenomen. Waarschijnlijk overwinteren de vogels minder zuidelijk omdat in Oost-Europa en zuidelijk Scandinavie meer voedsel beschikbaar is in de vorm van allerlei afval.