

het dorp nemen de aantallen toe.

Fitis

De meest algemene vogel in de duinen is de Fitis of Duinmus zoals hij ook wel wordt genoemd. Alleen op kale duintoppen en open grasvegetaties komt de Fitis niet voor. Een paar struiken of een enkele Meidoorn met wat onderbegroeiing is voor de Fitis voldoende om daar zijn territorium te vestigen.

Ekster

De eksterstand blijft stabiel. Deze wat "geladen" soort kan zich ondanks het schoner worden van het duin door geen Fazanten meer te voeren en het opruimen van kadavers door de vos, goed handhaven.

Toch lijkt zich een tendens te gaan ontwikkelen dat de Ekster de komende jaren wat zal gaan afnemen.

R.Sluijs
E.Aartse

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

BEZOEKERSAANTALLEN JAN VERWEIJ-NATUURCENTRUM IN 1988

Maand	individueel			groepen	totaal- generaal	aantallen	
	volw.	kind	Totaal			1987	1986
januari	-	-	-	12	12	-	-
februari	-	-	-	193	193	80	79
maart	36	86	122	37	159	277	398
april	175	122	297	100	397	161	207
mei	35	53	88	202	290	279	102
juni	50	86	136	445	581	361	261
juli	228	298	526	113	639	360	186
augustus	127	176	303	26	329	431	290
september	97	192	289	163	452	415	188
oktober	131	123	254	107	361	477	268
november	58	119	177	148	325	256	252
december	-	-	-	-	-	-	252
							145
Totaal	937	1255	2192	1546	3738	3076	2376

Het is een verheugend verschijnsel, dat de bezoekersaantallen blijven stijgen. Ten opzichte van 1987 is het bezoekersaantal gestegen met met + 20% en ten opzichte van 1986 zelfs met + 57%.

Steeds meer mensen weten de weg naar het Jan Verweij-Natuurcentrum te vinden. De komende jaren zien we dan ook met vertrouwen tegemoet.

-0-0-0-0-0-0-0-0-