

Inhoud

-----Bij de voorplaat	pag 3
-----Verslag ledenvergadering 22 februari 1990	pag 4
-----Verslag ledenvergadering 30 maart 1990	pag 5
-----Verslag ledenvergadering 27 april 1990	pag 5
-----Agenda	pag 6
Ees Aartse: Plantenvondsten	pag 7
-----Aanwinsten bibliotheek	pag 10
-----Stivono Kwartaalverslag januari-maart	pag 11
-----Milieu-bijenmarkt	pag 12
Jelle van Dijk: PTT: geen postbestelling maar vogelpunttelling	pag 13
H.Koning: Konijnen en de Parelmoervlinders	pag 15
-----Waddenexcursie	pag 16
R.de Mooij: De techniek staat voor niets	pag 16
-----Waarnemingen	pag 17

Bij de voorplaat



Torenvalk

De Torenvalk is een bekende roofvogel uit onze omgeving. Tot in de tachtiger jaren vormde de Grote Kerk of St.-Jeroenskerk een geliefde broedplaats. In 1976 wisten hier zelfs drie paar jongen groot te brengen.

Ook nu broedt de Torenvalk nog elk jaar

in onze omgeving, soms in een nestkast, maar ook wel in oude nesten van Zwarte Kraaien en Eksters.

Het gehele jaar door kunnen we deze algemene roofoogel biddend boven de polder Hoogeweg en langs snelwegen bewonderen, wanneer hij speurt naar veldmuizen, zijn belangrijkste voedsel. Bollenvelden zijn minder in trek, omdat hier veel minder veldmuizen voorkomen. In jaren dat veldmuizen schaars zijn, vor-

men in de broedtijd ook jonge, onervaren Spreeuwen en Huismussen een belangrijke voedselbron.

Gedurende de broedtijd is er een strikte taakverdeling. Het vrouwtje bebroedt de eieren en het mannetje zorgt voor het voedsel in die periode.

Ook als de jongen geboren zijn sleept het mannetje het voedsel aan, terwijl het vrouwtje de prooi verscheurt en deze in stukjes onder de jongen verdeelt. Dat dit erg belangrijk is, blijkt wel als het vrouwtje in deze periode sterft. De jongen lopen dan het gevaar van honger om te komen. De oorzaak is dan vaak niet het gebrek aan prooidieren. Het blijkt dat het mannetje niet geleerd heeft de prooidieren in stukjes te scheuren. Als de jongen na drie weken een warm, dicht verenkleed hebben ontwikkeld gaat het vrouwtje mee op jacht. De jongen behoeven nu immers niet meer beschermd te worden tegen de kou. Bovendien is hun eetlust sterk toegenomen. Na ongeveer een maand vliegen de jongen uit en worden dan nog enige tijd door de ouders gevoerd voordat ze zelf op jacht moeten.