

Fluiter	-	-	-	-	-	1	-	-
Tijftjaf	12	9	8	10	11	17	29	20
Fitis	8	6	8	10	7	8	7	5
Grauwe Vliegenvanger	-	-	-	1	-	1	2	-
Staartmees	2	-	2	-	1	2	2	2
Glanskop	-	0-1	-	1	-	1	2	1
Pimpelmees	15	12	4	16	13	16	21	19
Koolmees	35	33	15	33	23	27	36	30
Boomklever	-	1	1?	2	1	1	1	2
Boomkruiper	6	6	7	4	5	6	9	9
Wielewaal	1?	-	-	-	-	-	-	-
Vlaamse Gaai	2-4	2-3	3-4	3	2	4	2	4

Ekster	2	1	1	1	1	1	2	3	3
Kauw	12-15	15-20	20	15-20	7	12	8	10	11
Zwarte Kraai	-	1-2	1	1	1	3	2	3	3
Spreeuw	15	10	25	15	?	14	13	13	11
Huisemus	8	5	7-9	?	?	4	?	3	4
Vink	2	-	-	2	2	1	-	-	-
Groenling	3	0-2	0-2	2	2	2	-	1	-
Nijlgans	1?	-	-	-	-	-	-	1	1
Inventarisatietijd in uren	24	10.5	18	21	21	28.5	29	43	33

?: aanwezig als broedvogel, aantal niet bekend

Broedvogelinventarisaties in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 1992

Samenstelling Rien Sluys

In dit artikel worden de inventarisaties die plaatsvonden in de 5 kavels in de Amsterdamse Waterleidingduinen beschreven. Tevens is er een zogenaamd secundair kavel, De Blink/Langevelderduin onderzocht. Dit is een gebied dat niet ieder jaar wordt geïnventariseerd, maar waarvan telgegevens wel van belang zijn.

1 Gijs Kokkieshoek

geïnventariseerd door
E.Aartse

Terreinomschrijving:
Het geïnventariseerde gebied wordt in het noorden begrensd door de Halfwegse Slag, in het oosten door het rijwielpad, in het zuiden door de Langevelderslag en in het westen door de Houtweg. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 47 ha. waarvan:

circa 7 ha. duinberkenbos

circa 15 ha. duindoorn/vlierstruweel

circa 5 ha. stuifzand en stuifplekken

circa 20 ha. open duin met Duinriet, Zandzegge en Helm. Volgens het beheersplan wordt een beperkte verstuing toegelaten.

Het terrein is erg geaccidenteerd. Vanaf de Langevelderberg (27 m + NAP) loopt het terrein glooiend af naar de Langevelderslag en de Halfwegse Slag.

Paden komen in het terrein niet meer voor. De oude voerbanen zijn thans geheel dichtgegroeid. De Rozen-del is nauwelijks meer begaanbaar.



Tapuit

Tabel 1: Broedvogels van Gijs Kokkieshoek: 1986 t/ m 1992

Soort	86	87	88	89	90	91	92
Bergeend	-	-	-	1	-	-	-
Patrijs	1	1	1	-	-	-	-
Fazant	3	3	3	3	3	2	1
Scholekster	-	-	-	1	-	-	-
Wulp	2	2	-	1	1	1	-
Houtduif	16	14	12	9	6	7	5
Tortelduif	2	2	2	2	1	1	1
Koekoek	1	1	1	1	1	1	1
Boomleeuwerik	1	1	1	2	1	1	1
Boompieper	5	3	3	3	5	4	1
Graspieper	1	-	2	2	-	2	1
Winterkoning	3	3	4	6	5	2	3
Heggemus	18	19	16	18	19	17	23
Roodborst	1	-	-	2	1	1	1
Nachtegaal	15	16	14	10	13	16	13
Gekraagde Roodstaart	-	-	-	-	-	1	-
Roodborsttapuit	1	1	1	2	2	1	1
Tapuit	8	12	11	10	3	2	3
Merel	8	8	8	10	8	6	3

Zanglijster	1	1	1	1	1	-	-
Sprinkhaanriet-zanger	3	3	4	3	1	1	1
Braamsluiper	1	2	2	3	4	4	1
Grasmus	12	11	10	11	13	10	13
Zwartkop	2	1	2	1	1	-	-
Tjiftjaf	1	-	1	2	2	3	2
Fitis	23	24	26	20	22	18	15
Pimpelmees	1	1	-	-	1	-	-
Koolmees	6	7	4	3	5	3	3
Vlaamse Gaai	2	2	2	1	1	1	1
Ekster	9	10	7	5	4	5	4
Ringmus	4	2	-	1	-	-	-
Kneu	11	9	8	6	5	4	4
Geelgors	-	-	1	-	-	-	-
Totaal aantal soorten	30	26	25	29	26	25	23
Totaal aantal broedgevallen	162	159	147	140	129	114	102

2 Boeveld-West

geïnvventariseerd door W. Baalbergen en Mevr. H. Veeffkind-Lieneman

Terreinomschrijving:

Het geïnvventariseerde gebied wordt in het Noorden begrensd door het Finnlayweggetje, in het oosten door de Houtweg en een stukje onverhard wandelpad, in het zuiden door het raster langs de Langevelderslag en in het westen door het Van Limburg Stirumkanaal.

Het onderzochte gebied kan men grofweg in twee delen verdelen. Het zuidelijke deel wordt grotendeels bepaald door een vrij kaal duinenplateau met toppen van 18 m. Het noordelijke deel is voorzien van struvelen. De oppervlakte bedraagt circa 40 ha.

De recreatiedruk is er, mede als gevolg van de dichtbij gelegen ingang, erg groot.

Tabel 2: Broedvogels van Boeveld-West: 1986 t/m 1992

Soort	86	87	88	89	90	91	92
Wilde Eend	-	-	-	-	-	-	1
Fazant	3	2	1	1	2	3	2
Meerkoet	-	-	-	-	-	2?	1
Scholekster	-	-	-	-	-	1?	-
Houtduif	4	3	3	4	3	5	3
Tortelduif	1	1	1	1	1	1	-
Koekoek	1	1	1	1	1	1	1

Boompieper	1	2	2	2	2	1	2
Graspieper	1	1	2	2	2	3	2
Winterkoning	2	3	5	8	7	2	4
Heggenmus	15	14	15	16	16	7	12
Roodborst	1	1	1	1	1	1	4
Nachtegaal	8	11	7	9	8	8	7
Paapje	-	-	-	-	-	1	-
Gekraagde Roodstaart	-	-	-	-	-	-	1
Roodborsttapuit	4	3	4	4	3	3	5
Tapuit	4	3	2	2	1	-	-
Merel	2	3	5	6	4	5	4
Zanglijster	-	-	-	-	-	1	1
Sprinkhaanriet-zanger	2	2	2	2	2	1	2
Bosrietzanger	1	1	1	1	1	1	1
Kleine Karekiet	-	-	-	-	-	1	-
Braamsluiper	2	2	1	1	1	1	2
Grasmus	14	15	14	10	10	13	12
Tjiftjaf	-	-	2	1	1	1	2
Fitis	19	19	21	20	18	16	10
Staartmees	-	-	-	-	-	-	1
Glanskop	1	1	-	-	1	1	-
Pimpelmees	1	1	1	-	1	1	-
Koolmees	4	2	4	3	3	3	4
Vlaamse Gaai	1	-	-	2	1	3	-
Ekster	2	2	4	4	3	5	5
Zwarte Kraai	1	1	1	1	1	1	1
Kneu	4	3	4	3	3	10	7
Rietgors	-	-	-	-	-	-	2
Totaal aantal soorten	25	24	24	24	26	28	27
Totaal aantal broedgevallen	99	97	104	105	97	104	99

3 Wolfsveld-West

geïnvventariseerd door B. Heethuis

Terreinomschrijving:

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Ruijghoek Schulpweg, in het oosten door het Finnlayweggetje en in het verlengde daarvan door een denkbeeldige lijn over de Kop van het Ronde Vlak en rechts langs het Spejndel, in het zuiden door het Finnlayweggetje en in het westen door het Van Limburg Stirumkanaal. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 35 ha., waarin 5 delen n.l. Lange Vlak, Spejndel, Abe-

lendel, Biezenvlakje en Ronde Vlak grotendeels bestaan uit Meidoorn, Liguster, Berk, Zomereik, Kardinaalsmuts, Vlier en Duindoorn.

Tabel 3: Broedvogels Wolfsveld-West: 1986 t/m 1992

Soort	86	87	88	89	90	91	92
Wilde Eend	-	-	-	1	1	-	-
Fazant	4	3	3	3	3	3	3
Houtduif	7	5	7	9	9	9	6
Koekoek	1	1	1	1	1	1	1
Tortelduif	2	1	1	1	2	1	-
Boomleeuwerik	-	-	-	1	-	-	-
Boompieper	4	4	5	6	4	2	-
Graspieper	-	-	1	1	1	1	-
Winterkoning	1	3	5	10	14	5	5
Heggemus	14	16	13	16	19	20	15
Roodborst	-	-	-	-	-	1	-
Nachtegaal	11	13	13	16	11	11	9
Gekraagde Roodstaart	-	-	-	-	1	-	-
Roodborsttapuit	2	1	2	2	1	2	3
Tapuit	-	1	-	-	1	1	-
Merel	6	5	4	5	8	5	2
Zanglijster	-	1	-	2	1	2	-
Sprinkhaanrietzanger	5	4	2	5	5	2	2
Braamsluiper	3	4	2	2	2	1	-
Grasmus	14	18	22	25	14	13	10
Tuinfluit	-	-	1	-	-	-	-
Zwartkop	-	2	-	1	1	-	-
Tjiftjaf	1	-	-	2	1	1	2
Fitis	19	18	16	26	26	21	13
Pimpelmees	2	-	1	1	-	-	-
Koolmees	6	5	3	8	5	4	3
Vlaamse Gaai	3	2	1	1	1	2	1
Ekster	6	3	4	3	4	4	3
Zwarte Kraai	-	-	-	-	1	1	1
Kneu	4	1	1	4	6	6	3
Totaal aantal soorten	20	21	21	25	26	24	17
Totaal aantal broedgevallen	115	111	108	152	143	119	82

4 Westhoek/Haasvelderbeken

geïnventariseerd door J. van Saase

Terreinomschrijving:

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Nieuwe Haasvelderweg of Heiweg, in het oosten door de slag van de Westhoek, in het zuiden door de Starrenbroekerweg en in het westen door de Haasvelder Klugtweg. Midden door het gebied loopt de Scheidingsbaan, een smal voetpad langs een voormalige eigendoms- en jachtgrens waarop nog oude grensstenen voorkomen met het monogram van mr. Jan Six (1668-1750), een van de eerste eigenaren van dit gebied na de grote verkoop van domeingronden. Ten oosten van de scheidingsbaan ligt de Westhoek, vroeger behorend tot het jachtveld "Paardenkerkhof".

Het terrein is niet sterk geaccidenteerd. De Trapjesberg is met ruim 16 meter + NAP de hoogste duintop. In de omgeving van het Haasveld (oorspronkelijk Haags-Veld) zijn nog vele sporen aanwezig van een vroegere landbouwvestiging, zoals oude teelthoecken (=duinkrochten) en weiljes, droge wateringen, greppels en oude beekbeddingen.

Tabel 4: Broedvogels van Westhoek/Haasvelderbeken: 1986 t/m 1992

Soort	86	87	88	89	90	91	92
Fazant	8	7	7	10	20	19	18
Kievit	-	-	1	-	-	-	-
Wulp	1	1	-	-	-	-	-
Houtduif	8	10	16	5	5	6	4
Tortelduif	2	2	3	1	4	2	3
Koekoek	2	2	2	3	3	3	4
Bosuil	-	1	-	-	-	-	-
Groene Specht	1	-	1	-	1	1	1
Boompieper	14	9	9	10	14	11	12
Winterkoning	3	7	9	16	22	9	9
Heggemus	11	15	21	17	12	13	9
Roodborst	1	1	1	3	1	2	2
Nachtegaal	14	15	12	13	10	10	11
Gekraagde Roodstaart	2	2	2	1	2	5	4
Paapje	6	6	7	5	4	3	1
Roodborsttapuit	1	1	2	2	2	2	6
Tapuit	3	1	1	-	-	-	-
Merel	4	3	6	5	7	2	4
Zanglijster	-	1	1	1	-	-	-
Sprinkhaanrietzanger	6	12	10	17	15	10	10
Braamsluiper	4	3	6	6	7	6	3

Grasmus	12	14	18	26	25	19	21
Tuinfluit	1	-	-	-	-	-	1
Zwartkop	1	-	2	-	-	1	-
Tijftjaf	-	-	4	3	5	3	4
Fitis	47	44	51	46	52	47	44
Staartmees	2	-	-	-	1	-	-
Glanskop	1	1	-	-	-	-	-
Pimpelmees	2	2	2	3	4	5	4
Koolmees	7	7	14	18	15	14	11
Vlaamse Gaai	1	2	3	2	4	4	2
Ekster	3	5	7	7	6	7	9
Zwarte Kraai	2	2	1	-	2	2	2
Ringmus	-	1	1	-	2	-	-
Vink	-	1	-	-	1	1	-
Kneu	11	12	7	8	10	10	6
Barmsijs	-	-	1	-	-	-	-
Totaal aantal soorten	30	29	31	24	28	27	26
Totaal aantal broedgevallen	182	190	228	218	256	219	205

5 Hoekgatterduin

geinventariseerd door Th. van Trigt

Terreinomschrijving:

Het onderzochte gebied is c. 50 ha groot. In het noorden en oosten wordt het terrein begrensd door de Hoekgatterweg, in het zuiden door de Zilkerslag (Joppeweg) en in het westen door het Oosterkanaal. Door het gebied lopen enkele zandpaden.

Het gebied kenmerkt zich door een rug van vrij kale duinen met veel stuifgaten. We vinden verspreid over het terrein enkele bosjes van voornamelijk eikenhakhout zoals b.v. het Amerikaanse Bosje. Langs het Oosterkanaal vinden we enkele bosjes van de Oostenrijkse den.

Tabel 5: Broedvogels van Hoekgatterduin: 1986 t/m 1992

Soort	86	87	88	89	90	91	92
Bergeend	-	-	-	-	-	1	1
Wilde Eend	-	-	4	3	1	3	2
Kuifeend	-	-	-	-	-	1	1
Fazant	6	3	4	6	4	2	-
Waterhoen	-	-	-	1	-	-	-
Houtsnip	-	-	1	-	-	-	-
Wulp	-	-	1	-	-	-	-
Houtduif	4	3	7	7	13	15	10

Tortelduif	-	1	1	1	2	2	3
Koekoek	1	1	1	1	1	1	-
Ransuil	-	-	-	-	1	-	-
Groene Specht	2	2	2	2	3	3	2
Grote Bonte Specht	1	3	3	-	2	1	-
Boomleeuwerik	1	1	-	1	-	-	-
Veldleeuwerik	1	1	-	-	-	-	-
Boompieper	7	8	9	9	6	5	4
Graspieper	-	1	-	1	1	-	1
Witte Kwikstaart	1	-	-	-	-	-	-
Winterkoning	1	2	4	6	5	3	5
Heggenmus	8	7	7	15	10	11	11
Roodborst	4	3	2	4	4	6	5
Nachtegaal	8	9	12	9	11	10	11
Gekraagde Roodstaart	1	3	3	5	6	8	7
Roodborsttapuit	-	1	-	-	1	-	-
Tapuit	2	1	1	1	-	1	-
Merel	4	5	6	6	8	9	8
Zanglijster	1	1	-	2	-	3	1
Sprinkhaanriet-zanger	-	3	1	3	4	-	1
Braamsluiper	-	1	2	2	2	3	2
Grasmus	4	5	10	16	12	11	14
Tuinfluit	2	1	2	1	1	-	-
Zwartkop	1	-	-	-	1	-	1
Tijftjaf	-	1	2	4	4	1	3
Fitis	21	23	28	30	42	24	22
Staartmees	1	1	-	2	1	2	2
Glanskop	1	-	-	-	1	-	2
Pimpelmees	4	2	3	3	5	9	9
Koolmees	8	7	8	11	9	15	10
Wielewaal	-	-	1	-	1	-	-
Vlaamse Gaai	3	2	2	4	2	4	3
Ekster	4	5	6	7	8	12	8
Zwarte Kraai	-	-	-	-	1	4	3
Ringmus	-	-	1	-	-	1	-
Vink	-	-	2	2	2	3	3
Groenling	-	-	-	1	-	-	-
Kneu	2	1	3	2	5	2	2
Geelgors	-	1	-	-	-	-	-

Totaal aantal soorten	29	33	32	31	35	31	30
Totaal aantal broedgevallen	105	110	140	167	181	176	157

Tabel 6: Vastgesteld aantal broedgevallen per soort: Kavel 1 t/m 5 1986 t/m 1992

Soort	86	87	88	89	90	91	92
Bergeend	-	-	-	1	-	1	1
Wilde Eend	-	-	4	4	2	3	3
Kuifeend	-	-	-	-	-	1	1
Waterhoen	-	-	-	1	-	-	-
Patrijs	1	1	1	-	-	-	-
Fazant	24	18	19	23	32	29	28
Meerkoet	-	-	-	-	-	2?	1
Scholekster	-	-	-	-	-	1?	-
Kievit	-	-	1	-	-	-	-
Houtsnip	-	-	1	-	-	-	-
Wulp	3	3	1	1	1	1	-
Houtduif	39	35	45	34	36	42	28
Tortelduif	7	11	8	6	10	7	7
Koekoek	6	6	6	7	7	7	7
Ransuil	-	-	-	-	1	-	-
Bosuil	-	1	-	-	-	-	-
Groene Specht	3	2	3	2	4	4	2
Grote Bonte Specht	1	3	3	-	2	1	-
Boomleeuwerik	2	2	1	4	1	1	1
Veldleeuwerik	1	1	-	-	-	-	-
Boompieper	31	26	29	30	31	23	19
Graspieper	2	2	5	6	4	6	4
Witte Kwikstaart	1	-	-	-	-	-	-
Winterkoning	10	18	27	46	53	21	26
Heggenmus	66	71	72	82	76	68	70
Roodborst	7	5	4	10	7	10	12
Nachtegaal	56	64	58	57	53	57	51
Gekraagde Roodstaart	3	4	4	6	9	14	12
Paapje	6	6	7	5	4	4	1
Roodborsttapuit	8	7	9	8	9	8	15
Tapuit	17	18	15	13	5	4	3
Merel	24	24	29	32	35	27	21
Zanglijster	2	4	2	6	2	7	2

Sprinkhaanrietzanger	16	24	19	30	27	14	16
Bosrietzanger	1	1	1	1	1	1	1
Kleine Karekiet	-	-	-	-	-	1	-
Braamsluiper	10	12	13	14	16	15	8
Grasmus	56	63	74	88	74	66	70
Tuinfluit	3	1	3	1	1	-	1
Zwartkop	4	3	4	2	3	1	1
Tijftjaf	2	1	9	11	13	9	13
Fitis	129	128	142	142	160	126	104
Staartmees	3	1	-	2	2	2	3
Glanskop	3	2	-	-	2	1	2
Pimpelmees	10	6	7	7	11	15	13
Koolmees	29	28	33	43	37	39	31
Wielewaal	-	-	1	-	1	-	-
Vlaamse Gaai	10	8	8	10	9	15	7
Ekster	24	25	28	26	25	33	29
Zwarte Kraai	3	3	2	1	5	8	7
Ringmus	4	3	2	1	2	1	-
Vink	-	1	2	2	3	4	3
Kneu	32	26	23	23	29	32	22
Barmsijs	1	1	2	-	-	-	-
Geelgors	1	1	-	-	-	-	-
Totaal aantal soorten	42	43	42	39	40	43	39
Totaal aantal broedgevallen	663	667	727	782	806	732	648

Toelichting:

De Houtduif heeft duidelijk een slecht broedsizoen doorgemaakt, met 28 broedgevallen is dit de laagste score sinds 1986. Een vergelijking met andere gebieden leert dat voor zover het duingebieden betreft dezelfde trend is te zien. Op de landgoederen vinden we geen teruggang, op Offem zelfs een stijging van het aantal broedgevallen.

T.a.v. Boompieper, Nachtegaal, Fitis zien we precies hetzelfde beeld als bij de Houtduif. Ook bij deze soorten is het aantal broedgevallen het laagst sinds 1986. In de overige duingebieden vindt er voor wat betreft de Nachtegaal niet of nauwelijks een achteruitgang plaats, maar bij de Fitis is het ook in de overige gebieden slecht gesteld.

De Tijftjaf ging vooruit, wat niet gezegd kan worden van de andere gebieden met uitzondering van de Coepelduynen. Merel en Zanglijster hebben het ook niet goed gedaan in de AW-duinen, terwijl er nauwelijks verschil te zien is in de overige kavels.

De Braamsluiper vertoont een vreemd beeld, terwijl de stand in de AWD is gehalveerd, van 15 naar 8 broedgevallen, vertoont hij stabilisatie en vooruitgang in de

overige duinkavels.

De Roodborsttapuit heeft een prima broedseizoen achter de rug. De stand is bijna verdubbeld, van 8 naar 15 broedgevallen. Vreemd is het dat dit beeld absoluut niet klopt met de overige duingebieden, zeker niet met de Coepelduynen waar de stand terugliep van 7 naar 2 broedgevallen.

Met het Paapje gaat het ronduit slecht. In het enige nog aanwezige bolwerk in de Westhoek/Haasvelderbeken

kon slechts één broedgeval worden gesignaleerd. Na een periode van zes jaar waarin de stand vrij stabiel was, lijkt er nu stevig de klad in te zitten.

Van de 39 soorten die tot broeden kwamen, hebben er, in verhouding tot het vorige broedseizoen 20 een lager aantal broedgevallen opgeleverd, waarvan er 5 geheel niet meer tot broeden kwamen, bleven 8 soorten gelijk en hebben 11 soorten een hoger aantal broedgevallen opgeleverd.

Broedvogelinventarisatie De Blink / Langevelderduin

geïnventarieerd door Rien Shuys

Terreinomschrijving:

Het gebied wordt in het zuiden begrensd door de Noraweg, in het westen door deels een schelpenpad en deels een klinkerweg die naar radio Nora voert, in het noorden door de Langevelderslag en in het oosten door het rijwielpad langs de binnenduinrand.

Het terrein, ter grootte van zo'n 80 ha. is zeer geaccidenteed. Alleen in de dellen komen er wat struiken voor en staan enkele Meidoorns en Vlieren. Langs de Langevelderslag bevinden zich enkele dennen. In het westen bevindt zich op enkele plaatsen zeer dicht struweel.

Het middengedeelte van het terrein bestaat grotendeels uit stuifduinen. In het terrein, dat niet voor publiek toegankelijk is, bevinden zich geen paden.

Broedvogels van De Blink/Langevelderduin

Soort	1974	1975	1979	1980	1985	1992
Wilde Eend	0-2	2-3	3-4	4-5	-	-
Patrijs	-	1	1	1	-	-
Fazant	1-2	?	1-2	6-8	3	1
Scholekster	2	4-6	-	1	-	-
Kievit	2	3	1	2	-	-
Wulp	4	4	4	4	4	-
Stormmeeuw	1	-	-	-	1	-
Zilvermeeuw	1	-	-	-	-	-
Houtduif	4-5	6-8	7-9	10-12	12-15	18
Tortelduif	1	1	1	1	2	1
Koekoek	1-2	1	2	2	3	2
Kuifleeuwerik	1	-	-	-	-	-
Boomleeuwerik	-	2	0-1	1	-	-
Veldleeuwerik	25-30	25-35	2-3	2	-	-
Boompieper	5-6	3-5	-	-	-	-
Graspieper	5-7	2-4	1	2	-	4

Winterkoning	7-9	7-9	0-1	3	-	5
Heggenmus	20-22	15-20	9-12	13	42	31
Roodborst	1-2	1-2	-	2	-	2
Nachtegaal	2	4-5	4	5	19	28
Gekraagde Roodstaart	0-1	-	-	-	1	-
Roodborsttapuit	3	3	1-2	2	1	2
Tapuit	12-15	6-8	8-10	10-12	17	2
Merel	5-6	3-5	3-4	5	7	4
Zanglijster	1	1	-	-	-	-
Sprinkhaanzanger	-	1	0-1	1	2	-
Bosrietzanger	-	1	-	-	1	-
Braamsluiper	-	-	1-2	2	4	6
Grasmus	10-12	5-8	8-10	8	18	41
Zwartkop	-	1	-	-	1	-
Tijftjaf	-	-	-	-	-	2
Fitis	14-18	20-25	10-12	12-15	40	18
Pimpelmees	-	-	-	-	-	1
Koolmees	-	1	-	1	3	3
Vlaamse Gaai	-	-	-	-	-	1
Ekster	2-4	1-2	8-10	11	10	5
Zwarte Kraai	-	-	1	1	1	-
Ringmus	-	0-1	-	-	1	-
Vink	-	-	-	-	-	1
Groenling	-	0-1	1	1	-	-
Kneu	35-45	40-50	12-15	10-12	20	12
Totaal soorten	27	30	25	28	23	22