

Het is een fraai meeuwtje met, zoals de gidsen aangeven, in inkt gedoopte vleugelpunten. Dat betreft dan de volwassen vogels. De jonge beesten hebben een v-vormige zwarte tekening op de bovenzvleugel en wat zwart aan kop en hals. ook missen ze nog de kenmerkende gele snavel. Het is wat je noemt een lief meeuwtje. Dit in tegenstelling tot b.v. de Zilvermeeuw die iets wreeds over zich heeft.



Drieteenmeeuw

In het broedgebied, de vogelrotsen in het noorden zijn ze vaak zo tam dat je ze haast op het nest kan aanraken. Dat doet me denken aan die keer dat we op een kiezelstrandje stonden met boven ons wat lage rotspartijen die bezaaid waren met broedende Drieteentjes.

Uit enkele nesten waren wat jongen gevallen, waarvan er één nog leefde. Natuurlijk wisten wij het beter dan de natuur en werd het beestje teruggezet in het nest er boven. De moeilijkheid was echter dat we niet wisten uit welk nest het kwam, zodat er op goed geluk één werd uitgekozen waar geen meeuw opzat. Toen deze terugkwam ging hij of zij op de rand van het nest zitten, kennelijk volkomen in de war. Je kon het dier horen denken: wat heb ik nou aan m'n klomp hangen. Lieve meeuwtjes, die hun nesten soms maken op de kozijnen van de pakhuizen in Noorse stadjes. In één van die stadjes, Alesund, staat in het centrum een rots met daarop ook een groot aantal broedende vogels. Totdat men er later een net over spande. De bewoners hadden last van de roep van de Drieteenmeeuw, het melodieuze "Kittiwake", waaraan het dier ook de Engelse naam te danken heeft.

De lieve Drieteenmeeuw tegenover de wrede Zilvermeeuw. Natuurlijk is dat maar onzin. We willen de dieren maar al te graag menselijke maatstaven aanleggen. Lief en wreed bestaan in de natuur niet. Dieren handelen maar uit één motief: zorg dat je blijft voortbestaan.

Bijzondere Soorten Project 1992, de broedvogels

Ab Steenvoorden

Sinds een aantal jaren verzamelt SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) gegevens over aantallen, verspreiding en aantalsverloop van broedvogels in Nederland. Omdat bij gewone inventarisaties lang niet alle delen van Nederland in z'n geheel worden geteld, heeft men voor een aantal "bijzondere soorten" broedvogels het BSP project opgezet. Hieronder vallen een aantal broedvogelsoorten, die landelijk of regionaal weinig voorkomen, en vrijwel alle soorten kolonievogels.

Het voordeel van dit BSP is dat het maar om een beperkt aantal soorten gaat, waar gericht naar gezocht kan worden. Hierdoor kunnen betrekkelijk grote gebieden in een relatief korte tijdsduur onderzocht worden. Het streven van SOVON is om de soorten die opgenomen zijn in het BSP jaarlijks landdekkend te inventariseren.

Ook onze vogelwerkgroep doet al verschillende jaren aan dit project mee. Wij beperken ons voorlopig nog tot een aantal soorten die in het project zijn opgenomen en bij ons in de omgeving als broedvogel voorkomen. Het ligt wel in de bedoeling om het aantal te tellen soorten in de komende jaren flink uit te breiden.

De vogelsoorten waarom het in dit project gaat zijn ingedeeld in vier verschillende categorieën:

- Kolonievogels
- Zeldzame Broedvogels
- Schaarse Broedvogels
- Algemene Broedvogels


Helaas komen er geen soorten bij ons in de omgeving tot broeden die in de categorie Zeldzame Broedvogels vallen.

De soorten die wij hebben geteld zijn:

Kolonievogels: Blauwe Reiger, Stormmeeuw en Visdief.

Schaarse Broedvogels: Boomvalk, Geelgors, Kuileeuwerik, Patrijs, Sperwer, Torenvalk, Zomertaling en Groene Specht.

Algemene Broedvogels: Gierzwaluw, Huiszwaluw, Kuifmees en Zwarte Roodstaart.



Kuileeuwerik

Resultaten van 1992

Kolonievogels

Blauwe Reiger; alleen in landgoed Offem in Noordwijk, 27 bewoonde nesten.

Stormmeeuw; één paar heeft gebroed op een gebouw

langs de Tespellaan en waarschijnlijk een paar op de oude vuilnisbelt langs de Tespellaan in Noordwijkerhout.

Visdief; een alarmerend paartje werd gezien op omgespoten land bij de onlangs afgebroken boerderij Sixenburg.

Schaarse Broedvogels

Boomvalk; twee paar kwamen tot broeden, één paar op landgoed Offem en een paartje in de Noordduinen, ter hoogte van de Duindamseslag.

Geelgors; deze soort is niet meer gevonden en is helaas als broedvogel uit onze omgeving verdwenen.

Kuifleeuwerik; tien tot elf broedparen werden er vastgesteld. Vinkenveld, Rijnsoever en de Wilhelmina Boulevard blijven de meest favoriete plaatsen van deze soort. Patrijs; hoogstwaarschijnlijk hebben we nog lang niet alle broedparen gevonden, maar tot nu toe zijn er 22 territoria vastgesteld.

Sperwer; vijf broedgevallen werden er bij ons in de omgeving vastgesteld, vier daarvan op de landgoederen en één paar in de zuidelijke AW-duinen bij Sasbergen.

Torenvalk; twaalf broedgevallen werden gevonden, maar ook bij deze soort is het wel zeker dat we nog niet alle broedgevallen hebben gevonden, dus het aantal zal volgend jaar waarschijnlijk wel hoger komen te liggen. Zomertaling; vier tot vijf paartjes werden gevonden in de Elsgesteerpolder en de Polder Hoogeweg en één paartje in de Bronsgeest, in de weilanden bij Oud-Leeuwenhorst.

Groene Specht; veertien territoria tot nu toe, vooral in de landgoederen en de terreinen van de psychiatrische ziekenhuizen.

Algemene Broedvogels:

Gierzwaluw; zie voor de resultaten van deze soort het artikel van Hein Verkade elders in deze Strandloper. Huiszwaluw; totaal 87 bewoonde nesten gevonden, de grootste kolonie 15 paar in de Ruigenhoek, 32 paar langs de Leidse Vaart bij de 's Gravendamseweg en 16 paar bij camping Johan de Wit langs de Kapelleboslaan. Kuifmees; negen tot twaalf paar, vooral in de dennen rond de Duindamseslag.



Zwarte Roodstaart; 15 paar, vooral op fabrieksterreinen en in de nieuwbouw. Enkele bekende plaatsen zijn hotel Huis ter Duin, Gemeentewerken Losplaatsweg en de kop van de Hoofdstraat.

Tot zover de resultaten van het vorige seizoen. Ook komend voorjaar worden deze soorten weer geteld. Indien er mensen zijn die na het lezen van dit artikelje ook mee willen helpen aan het SOVON Bijzondere Soorten Project, kan dat natuurlijk. Alle hulp is welkom en je hoeft echt geen goede vogelaar te zijn. De Groene Specht en de Torenvalk zijn vrij gemakkelijke soorten die iedereen wel eens tegenkomt.


Mensen die mee willen tellen kunnen zich opgeven bij Ab Steenvoorden (tel: 02522-18323) en krijgen dan het speciale telformulier thuisgestuurd.

Vogelnieuws

Ab Steenvoorden

Aankomstdata zomergasten in 1993

Evenals vorig jaar hebben we ook dit jaar weer een lijst achter in de Strandloper geplaatst waarop u de data kunt invullen van de eerste waarneming van de zomergasten. ook ditmaal hebben we gekozen voor soorten die allemaal in onze omgeving tot broeden komen en die ook herkenbaar zijn voor de wat minder ervaren vo-



gelaars.

Schroom dus niet en vul de lijst in!! Ook als er maar één of twee waarnemingen op ingevuld staan loont het al om hem in te sturen, hoe meer lijsten er terug komen des te beter het overzicht wordt dat we krijgen van de terugkomst van onze zomergasten.

In één van de volgende Strandlopers zullen we dan weer een overzicht publiceren met daarop alle aankomstdata, met die van de voorgaande jaren eraan. De lijsten kunnen gewoon op hetzelfde adres worden ingeleverd als de waarnemingenformulieren voor de waarnemingenrubriek.

Polder Hoogeweg

Het aantal Goudplevieren in de polder bedroeg op 1 november maximaal 2800 exemplaren. Tegen half december was dit aantal afgenomen tot een 550 exemplaren. Vanaf 13 december begon het aantal weer toe te nemen en werden er maximaal 3600 exemplaren waargenomen. Naast erg veel Kieviten werden er op 8 november 16 Watersnippen en op 21 16 Wulpen gezien. Ook dit