

Vogelnieuws

Ab Steenvoorden

Broedende Rouwkwikstaarten in de streek

Op 25 juni werd een paartje Rouwkwikstaarten waargenomen nabij de Langevelderslag. De vogels liepen te foerageren op het fietspad en rond de fietsstalling direct ten noorden van de Slag. Gezien de tijd van de waarneming en het gedrag van de vogels werd een broedgeval niet uitgesloten en na enig zoeken en observeren van de oude vogels kon het nest worden gelokaliseerd, het bevond zich in een zijwand van een niet in gebruik zijnde trampoline. De jongen zijn vlak voordat de trampoline in gebruik zou worden genomen (schoolvakantie, half juli) uitgevlogen.

Ook in het Vinkenveld, de Willem v.d. Bergh en rond de Uitwating bij Katwijk is tijdens het afgelopen voorjaar en zomer veelvuldig een paartje Rouwkwikstaarten waargenomen (zowel door de Noordwijkse als de Katwijkse Vogelwerkgroep). Het vermoeden bestaat dus dat ook in die omgeving (misschien op het terrein van de Estec) een paartje Rouwkwikstaarten heeft gebroed.

De Rouwkwikstaart is een ondersoort van de gewone Witte Kwikstaart en komt hoofdzakelijk als broedvogel in Groot-Brittannië en Ierland als broedvogel voor. Op het vaste land van Europa komen wel eens broedgevallen voor, en dan hoofdzakelijk langs de Noordzeekust. Ook in onze omgeving zijn al enkele broedgevallen van de Rouwkwikstaart vastgesteld, in 1973, 1974 en 1985. Het kan ook voorkomen dat een Rouwkwikstaart paart met een gewone Witte Kwikstaart. Deze 'gemengde' paartjes werden in 1925, 1974 en 1976 in onze omgeving vastgesteld.

Late wintergasten

Mogelijk komt het door de strenge winter van het afgelopen jaar, maar er werden het afgelopen voorjaar nog een opvallend aantal vrij typische wintergasten in onze omgeving waargenomen. Zo vlogen er op 1 april nog 6 Nonnetjes en op 7 mei nog 2 Brilduikers langs over zee, terwijl de laatste groepjes Pijlstaarten in de polders nog tot half april werden waargenomen. Een erg late Pestvogel werd gezien in de Holbeekstraat in Noordwijk op 12 april. De laatste Kramsvogel werd gezien op 25 april op het terrein van de Willem v.d. Bergh en de laatste Koperwieken, een exemplaar op 28 april langs het Dompad in Noordwijk en 3 exemplaren op de Willem v.d. Bergh, op 30 april.

Vogeltrek over zee

Zeetrek kijken kan vrijwel ieder jaargetijde erg leuk zijn. Zo ook in het voorjaar. Een belangrijke factor voor wel of geen goede zeetrek is de windrichting. In het voorjaar is het belangrijk dat de wind vanuit een oostelijke richting (noordoost - oost - zuidoost)

komt. Er kunnen dan gigantische aantallen sterns, steltlopers en eenden vlak langs de kust in noordelijke richting trekken. Tijdens het afgelopen voorjaar waren er een aantal dagen met noordoostelijke wind en vlogen er redelijke aantallen vogels langs de kust. Op 3 en 8 april werden in twee uur tijd 245 en 505 langsvliegende Smienten geteld. Wintertalingen werden gezien op 3 april, 161 exemplaren, op 4 april 100 en op 8 april 112 exemplaren. Op 15 mei werden in één uur tijd 540 Zwarte Zeeëenden geteld. Zilverplevieren werden gezien op 7 mei, 81 exemplaren, op 8 mei 295, op 9 mei 447 en op 12 mei 161 exemplaren. Rosse Grutto's werden niet in zulke vreselijke hoge aantallen waargenomen, maar toch werden ze regelmatig gezien, de hoogste aantallen waren 98 op 8 mei en 100 op 9 mei. Tureluurs werden gezien op 6 april, 142 exemplaren en op 17 mei, 63 exemplaren. Verder zijn opvallend qua aantal 2660 Kokmeeuwen, langsvliegend in drie uur op 6 april en 312 'noordse/dieven' in één uur op 8 mei.

Exoten in de regio

Een Zebra-vink werd gezien nabij het Jan Verweij natuurcentrum op 13 april. Een paartje Krooneenden en een paartje Mandarijneenden werden waargenomen in een poldersloot nabij het Oosterduinsemeer op 14 en 21 april en een vrouwtje Mandarijneend werd gezien langs het Laantje in het Vinkenveld. Een Casarca werd gezien op 27 april in de Polder Hoogeweg. Een hybride Casarca x Nijlgans werd waargenomen in de Binnenwating bij Katwijk op 11 mei. En tot slot, 2 Indische- of Streepkopganzen werden gezien langsvliegend over zee op 28 april.

'Engelse' Gele Kwikstaarten

Evenals de Rouwkwikstaart is ook de Engelse Gele Kwikstaart een ondersoort. Niet van de Witte Kwikstaart maar van de Gele Kwikstaart. Van de Gele Kwikstaart zijn vele ondersoorten bekend, waarvan de Noordse en de Engelse vrijwel jaarlijks, hoofdzakelijk op doortrek in april en mei in onze regio worden waargenomen.

De Engelse Gele Kwikstaart die bij ons wordt waargenomen is te herkennen aan de gele kop. Deze ondersoort broedt in Groot-Brittannië en langs de kust van Frankrijk, België en Nederland.

In Nederland broedt de soort in een circa 20 kilometer smalle strook direct langs de kust en dan met name in bollenvelden.

Ook rond Noordwijk is deze ondersoort regelmatig als broedvogel vastgesteld. Ook het afgelopen seizoen is de soort als doortrekker en als broedvogel waargenomen. Op 22 april werd een groep van 15 exemplaren gezien in de Coepelduynen. Minimaal 2 broedgevallen zijn er gevonden, één langs het Laantje in het Vinkenveld en één in de omgeving van het Oosterduinsemeer.