

# Boeveld-west BMP 2018

BMP Plot 489, grootte 27,1 ha  
Willem Baalbergen, Jan Veeffind en Tineke de Bruijn.

Willem en Jan hebben, met assistentie van Tineke, tussen 21 maart en 11 juni 12 bezoeken aan het gebied gebracht. Het avondbezoek was op 11 juni. Daarmee is het aantal bezoeken 2 stuks hoger dan in 2017 toen 10 bezoeken en geen avondbezoek werden gebracht.

Het gebied wordt in het noorden begrensd door het Finnlayweggetje, in het oosten door de Houtweg, in het zuiden door het raster van de Langevelderslag en in het westen door de Van Limburg Stirumvallei. Het betreft een vrij kaal duinterrein, met toppen tot 18 m. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 27,1 ha. Vanwege de ligging is de recreatiedruk redelijk groot. Langs de Houtweg vinden we begroeiing met struweel, terwijl in het noordelijk stuk het Verbrande Vlak ligt. Deze duinvallei is dicht begroeid met onder meer Ratelpopulier en is slecht toegankelijk.

Willem Baalbergen heeft het gebied in 1978 voor het eerst geïnventariseerd. Sindsdien zijn er veranderingen in het terrein aangebracht. Zo is het Van Limburg Stirum kanaal in 1995 gedempt. Daarbij is de hogere opslag van het

Verbrande vlak in het noorden verwijderd. In 2014 is dit vlak in het kader van het terugbrengen van de zogenaamde grijze duinen voor een deel geplagd. Het verbrande vlak is nu het beste stuk van de inventarisatie. Ter vergelijking is 1978 in de tabel opgenomen.

De laatste jaren is sprake van enig herstel voor wat betreft het aantal territoria dat vooral op het conto komt van de aan bomen gerelateerde soorten. De Nachtegaal en ook de Fitis zijn kennelijk vooral de laatste jaren achteruitgegaan maar zijn nu redelijk stabiel. Andere soorten zoals Rietzanger, Blauwborst, Tuinfluiter, Pimpelmees, Goudvink en Rietgors kunnen kennelijk geen vaste plek in het gebied veroveren, waarschijnlijk mede als gevolg van verlies aan broedgelegenheid. Het jaar 2018 is in dit opzicht echter een tegenslag geweest. Nieuw is de Buizerd die vele malen werd waargenomen op de grens met de Van Limburg Stirum vallei. Waarschijnlijk is dit hetzelfde paartje dat in Gijskockieshoek en ZHL Langeveld werd aangetroffen en dat vroeger in het Langeveldduin broedde. In 2018 liep het aantal broedvogels behoorlijk terug en is mogelijk te wijten aan de grote droogte in dit gebied tijdens voorjaar en zomer.



Boeveld-West op de Waternetkaart van de AW Duinen

BMP Boeveld-west vergelijking met 1978									
Soort / Jaar	1978	2016	2017	2018		1978	2016	2017	2018
Blauwborst	0	0	0	1	Merel	3	2	4	3
Boomleeuwerik	0	3	4	3	Nachtegaal	8	4	4	3
Boompieper	1	2	3	2	Patrijs	1	0	0	0
Bosrietzanger	0	1	0	0	Pimpelmees	0	0	1	1
Braamsluiper	1	1	2	2	Ringmus	2	0	0	0
Buizerd	0	0	0	1	Roodborst	1	1	1	0
Ekster	2	1	0	0	Roodborsttapuit	0	4	3	2
Fazant	2	0	0	0	Slobeend	1	0	0	0
Fitis	13	8	13	7	Tapuit	4	0	0	0
Gaai	0	1	0	0	Tijftjaf	0	2	1	1
Gekraagde Roodstaart	2	2	3	2	Tortelduif	2	0	0	0
Grasmus	5	10	8	7	Veldleeuwerik	1	0	0	0
Graspieper	1	2	2	3	Vink	0	3	8	5
Grote Bonte Specht	0	1	0	0	Winterkoning	8	1	2	1
Heggenmus	10	5	3	4	Wulp	2	0	0	0
Houtduif	2	2	1	1	Zanglijster	1	2	0	0
Kievit	2	0	0	0	Zwarte Kraai	0	1	2	1
Kneu	0	2	3	2	Zwartkop	0	2	1	2
Koekoek	1	1	1	1					
Koolmees	0	3	4	4	<b>Totaal territoria</b>	<b>79</b>	<b>67</b>	<b>74</b>	<b>59</b>
Meerkoet	3	0	0	0	<b>Totaal soorten</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>23</b>



Buizerd foto: Jan Hendriks