

HET SVN MOERASVOGEL-ONDERZOEK IN 1983

Kees Hazevoet

In 1983 startte een onderzoek naar het voorkomen van een aantal moerasvogelsoorten in Noordholland onder auspiciën van de SVN. Getracht werd een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aantallen en verspreiding van Fuut, Roerdomp, Bruine Kiekendief, Grote Karekiet, Sprinkhaanrietzanger en Snor in onze provincie. Ook in 1984 wordt dit onderzoek voortgezet. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de resultaten van 1983. Voor het verslag over de Fuut zie elders in dit nummer.

ROERDOMP

Er werden geen broedgevallen van de Roerdomp in onze regio vastgesteld. De enige waarnemingen uit de broedtijd werden gedaan in de Zandput Nieuwe Meer. Op 16 juni vloog een exemplaar op uit de Zandput richting Nieuwe Meer. Op 24 juni landde een exemplaar dat uit de richting Nieuwe Meer kwam vliegen in de Zandput en op 13 juli werd er 's ochtends en 's middags een exemplaar in de Zandput waargenomen.



BRUINE KIEKENDIEF

Van de Bruine Kiekendief werden broedgevallen vastgesteld in het Westelijk Havengebied (2), bij Halfweg (2), bij Ruigoord (1), Oeverland Liede (1), Zandput Nieuwe Meer (3), Diemerzeedijk (1), Vijfhoek (1), Barnegat (1) en mogelijk IJdoorn (1). In totaal dus in de regio 12-13 broedgevallen. Hieronder waren enkele gevallen van bigamie, waarbij mannetjes met meerdere wijfjes gepaard waren.

GROTE KAREKIET

Er werden geen territoria in de regio vastgesteld. De Grote Karekiet is helaas een voormalige broedvogel die voorheen op verschillende plaatsen in het Amsterdamse Bos en in Waterland broedde. Werd er in 1982 gedurende enkele dagen nog een zingend exemplaar bij Halfweg gehoord, in 1983 was ook dat niet het geval.

SPRINKHAANRIETZANGER

De Sprinkhaanrietzanger werd op een flink aantal plaatsen vastgesteld. In het Westelijk Havengebied waren 3 territoria, bij Halfweg 6, in het Sloterpark mogelijk 2, in de Zandput Nieuwe Meer mogelijk 1-2, langs de Diemerzeedijk 4, op de Vijfhoek 4-8 en bij het Barnegat 1. In totaal dus 18-26 territoria in de regio.



Sprinkhaanrietzanger

Jan van Laar

SNOR

Ook deze verwant van de vorige soort werd op een aantal plaatsen vastgesteld. Bij Halfweg waren er 3 territoria, in de Zandput Nieuwe Meer mogelijk 1, aan de Diemerzeedijk 2-4, op de Vijfhoek 6-10 en tenslotte in IJdoorn mogelijk 1. In totaal dus 11-19 territoria.

De volgende personen droegen bij tot het welslagen van het moerasvogelonderzoek:
Jan Joost Bakhuizen, Bert Jan Bol, Guus van Duin, Frank van Groen, Rob Sjouken,
Fred Vogelzang, Willem vd Waal & KH.

KLEINE BURGEMEESTER IN AMSTERDAM-NOORD

Ton Eggenhuizen

Op 6 december 1983 werd door Ton Eggenhuizen een Kleine Burgemeester in eerste winterkleed ontdekt op het IJ achter het Centraal Station. Hij werd het laatst gezien door Robert Heemskerk op 7 januari 1984 in de Stadsreinigingshaven aan de Papaverweg. In de tussenliggende periode werd hij daar door vele waarnemers gezien en kon uitvoerig bekeken, gefotografeerd en beschreven worden. Hierbij viel op dat twee handpennen van de linkervleugel iets korter waren dan de overige. Een mogelijke oorzaak hiervan zou een plaatselijke verwonding kunnen zijn.

Op 1 december 1983 werd door Tom Damn een 1e of 2e winter-exemplaar waargenomen op de Oostzanerplas. Mogelijk was dit dezelfde vogel. Er zijn twee eerdere gevallen van een Kleine Burgemeester in Amsterdam bekend. Op 23 & 24 januari 1942 zagen Fisher en Ladiges een exemplaar in de Nieuwe Herengracht (Med. Centr. Inst. Flor. Faun. Groot-Amsterdam nr. 1 (1942): 4). Verder is er een waarneming van 1 mei 1967 bij Sloterdijk door de Roever en Veling (Med. Blad VWGA 5 (nr. 2): 18).

Overigens werden er in de winter 1983/84 ook elders in Nederland opvallend veel Kleine Burgemeesters waargenomen.

Ton Eggenhuizen,
R. Claeszenstraat 76/1,
1056 WR Amsterdam.



*Kleine Burgemeester, 16 december 1983, Stadsreinigingshaven,
Amsterdam-Noord, Gerard van Gool.*