

BROEDVOGELS VAN DE BALKAN EN OMGEVING IN HET AMSTERDAMSE BOS  
IN 1983

Remco Daalder  
Hans Brouwer

Dit is alweer het zevende achtereenvolgende verslag van onze inventarisatiewerkzaamheden in en om de Balkan. Langzamerhand zal iedere VWG'er dan ook wel weten welk gebied hiermee bedoeld wordt. Voor een beschrijving van het gebied verwijzen we naar *De Gierzwaluw* 20: 35-37 (1982).

In 1983 bezochten we het gebied in totaal 17 keer tussen 4 maart en 7 juni. Er werd geïnventariseerd volgens de karteringsmethode, hetgeen nog altijd de betrouwbaarste manier is bij dergelijke kleine oppervlakken. In 1983 bezetten 26 vogelsoorten territoria in het inventarisatiegebied. In de tabel vindt u bijzonderheden over de aantallen in heden en verleden.

Tabel 1 Aantal bezette territoria van broedvogelsoorten van de Balkan en omgeving in 1981, 1982 en 1983. (ng = niet geteld)

<u>soort</u>	<u>aantal territoria</u>		
	1981	1982	1983
Fuut	-	-	-
Blauwe Reiger	1	6	17
Wilde Eend	ng	ng	ng
Fazant	3	2-3	3
Waterhoen	-	-	1
Meerkoet	5	1	-
Houtduif	ng	63-73	ng
Turkse Tortel	1	1	-
Bosuil	1-2	1-2	1-2
Grote Bonte Specht	1	-	0-1
Boerenzwaluw	1	2	3
Winterkoning	23-25	12-14	11-14
Heggemus	2-4	0-2	1-2
Roodborst	13	13-14	18
Nachtegaal	-	-	-
Merel	25-29	27-32	33-36
Zanglijster	8-10	5-6	8
Kleine Karekiet	5	3	7-8
Tuinfluit	2-5	max 3	0-2
Zwartkop	2-5	3-4	4-5
Tjiftjaf	4-5	4-5	4-5
Fitis	1	-	-
Goudhaantje	-	1	1
Matkop	1	1	2
Pimpelmees	14-17	17-20	19-20
Koolmees	14-17	14-15	8-10
Boomkruiper	2-4	4-5	7
Vlaamse Gaai	2-3	3-5	4
Ekster	2-3	2-5	2
Zwarte Kraai	1	1	-
Ringmus	9-10	6-8	6
Vink	4	5-6	1



## OPMERKINGEN

- De Fuut en de Nachtegaal lijken als broedvogel verdwenen te zijn. Voor 1980 broedde de eerste bij de Kleine Vijver en de tweede aan de zuidkant van de eigenlijke Balkan.
- De Blauwe Reiger, die zich in 1981 in een hoge spar in de Balkan vestigde, blijkt een vaste klant te worden. Doordat ze voornamelijk in sparren broeden is het erg moeilijk vanaf de grond het juiste aantal nesten vast te stellen. In 1982 waren er minstens 6 nesten en in 1983 minstens 17 (Alfred Blok *pers med*).
- Enkele vogelsoorten, die we min of meer als vaste broedvogels beschouwden, lieten ons nu in de steek: Meerkoet, Turkse Tortel en Zwarte Kraai. Daartegenover staat het eerste broedgeval van het Waterhoen en de hernieuwde vestiging van een Goudhaantje in het territorium dat ook in het voorgaande jaar was bezet. Tot in juni zat dit vogeltje hier fanatiek te zingen.
- De Roodborst had een topjaar met 18 bezette territoria. De Winterkoning bleef daarentegen op hetzelfde lage niveau van vorig jaar en vertoonde geen herstel. Een merkwaardige zaak want de winter van 1982/83 was niet bepaald streng te noemen. Zoals bekend zijn strenge winters sterke regulatiefactoren voor deze vogel.
- De stijging van het aantal broedparen van de Boomkruiper zette opnieuw door. Dit aantal steeg vanaf 1979 elk jaar zeer geleidelijk. Nu waren er 7 bezette territoria, in 1979 en daarvoor steeds maar één. Strenge winters hebben de stijging niet ongedaan gemaakt. Wellicht heeft het ouder worden van het Balkanbos hier wat mee te maken, hoewel dat bij een 36-jarig bos toch geen rol meer lijkt te spelen.

Remco Daalder,  
Bosporus 44,  
1183 GJ Amstelveen.

Hans Brouwer,  
Louis Chrispijnstraat 8",  
1065 HH Amsterdam.

