

DE AMSTERDAMSE GORZEN

Willem vd Waal

Iedereen die in de omgeving van Amsterdam naar vogels kijkt weet dat de *Rietgors* een algemene verschijning is die we vooral vinden op plaatsen waar riet en natte bosjes groeien. Het is een algemene broedvogel die we het gehele jaar waar kunnen nemen, al kost dat 's winters wat meer moeite. In strenge winters kan hij geheel ontbreken.

*Rietgors*


Jan v Laar

Een andere, vroeger vrij algemene, gors is de *Sneeuwgorz*. Degenen die al wat langer vogelen herinneren zich vast nog wel de grote groepen van zo'n 50 exemplaren die 's winters op de toenmalige opspuiterreinen ten westen van Sloterdijk verbleven. De *Sneeuwgorz* kunnen we vanaf oktober tot in maart zien. De vroegste waarneming uit de omgeving van Amsterdam is 20 oktober 1968, 2 ex Sloterdijk (Med Blad KNNV VWG 7 (1): 36). De laatste datum is 12 april 1944, 1 ex Rothoek (Med Centr Inst 6: 7). De laatste jaren is de *Sneeuwgorz* een vrij zeldzame verschijning in onze omgeving. Het is voor deze soort van belang dat er grote velden met onkruidzaden aanwezig zijn. Misschien zullen toekomstige opspuiterreinen weer grotere aantallen *Sneeuwgorzen* te zien geven dan we momenteel gewend zijn.

Van de overige gorzen geef ik hieronder het aantal waarnemingen per maand.

IJSGORS

november	december	januari	februari	maart	april
1	2	4	-	2	1



Sneeuwgorst

Jan v Laar

GEELGORS

In 1945 broedde de Geelgorst in de Noorder Legmeerpolder bij Bovenkerk, in dat jaar waren daar minstens 3 territoria. In hetzelfde jaar broedde hij bij Badhoevedorp (Med Centr Inst 7: 5). Frieswijk (1968) vermeld voor deze soort: Broedvogel (voormalige), voor zover na te gaan van 1947 tot 1961. In 1947 aangeduid als nieuwe broedvogelsoort voor het Amsterdamse Bos, in de jaren daarvoor wel enige zangwaarnemingen. Het grootste aantal territoria werd in 1949 vastgesteld, namelijk 7. In 1961 waren er nog 2 territoria, daarna is de soort nog maar enkele malen in het Amsterdamse Bos waargenomen.

januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september
3	1	3	1	2	2	-	-	1
oktober	november	december						
1	5	3						

De laatste jaren wordt de Geelgorst alleen tijdens de voor- en najaarstrek waargenomen.

ORTOLAAN

mei	juni	juli	augustus	september	oktober
7	-	-	1	1	2

Opvallend is het grote aantal mei-waarnemingen. Verder is het opmerkelijk dat het aantal waarnemingen de laatste jaren toeneemt, hetgeen ongetwijfeld een gevolg is van de toegenomen waarnemingsintensiteit en zeker geen weerspiegeling is van het voorkomen van de Ortolaan in het geheel. Zoals bekend heeft de soort het niet gemakkelijk en nemen de aantallen, ook buiten Nederland, sterk af.

GRAUWE GORS

Van de Grauwe Gors heb ik de volgende waarnemingen uit onze regio kunnen vinden:

7 april 1937 1 ex Grote IJpolder
 6 & 7 februari 1938 8 ex Amsterdammer Polder
 7 mei 1967 1 zingend ex Balkan, Asd Bos
 1 t/m 25 januari 1968 1 ex Sloterdijk
 10 januari 1969 1 ex Sloterdijk
 13 oktober 1980 1 ex Sloterdijk/Halfweg

Bovendien is er nog een waarneming van een *Dwerggors*: 1 mei 1892 1 ♀ 'bij Amsterdam' (Snouckaert van Schauburg 1908).

Voor het verzamelen van bovenstaande waarnemingen werd gebruik gemaakt van: *Jaarbericht Club Ned Vogelk, Limosa, Vogeljaar, De Waarnemer, Med Centr Inst Flor Faun onderzoek Groot-Amsterdam, Med Blad KNNV VWG Amsterdam, De Gierzwaluw*. Het overzicht pretendeert niet volledig te zijn!

Verwijzingen

Frieswijk, J J 1968 *De vogelwereld van het Amsterdamse Bos*. Wet Med KNNV 74.
 Snouckaert van Schauburg, R C E G J Baron, 1908 *Avifauna Neerlandica*. Leeuwarden.

Willem vd Waal,
 Laagte Kadijk 11'',
 1018 BA Amsterdam.



Ortolaan,
 11 mei 1982,
 omgeving gemaal Halfweg.

Willem vd Waal